

La coquette

Nom commun : coquette

Nom scientifique : *Labrus bimaculatus*

Famille : labridés

Ordre : perciformes

Classe : ostéichthyens

Comment la reconnaître ?


Proche de la vieille, la coquette s'en distingue par une grande bouche protractile, armée de fortes dents pointues, dont le bord arrière arrive presque à l'aplomb de l'œil, et par un préopercule à bord lisse.

La nageoire dorsale est longue, allant presque jusqu'au bout d'un pédoncule caudal puissant ; ses 15 à 18 premiers rayons sont épineux. La nageoire anale possède trois épines, alors que la caudale est courte à bord très arrondi.

Comportement

La coquette fréquente les fonds pierreux recouverts d'algues entre 10 m et 100 m de profondeur ; juvénile, elle vit de préférence dans les prairies de zostères ou de posidonies, alors qu'adulte, elle se cantonne

dans les zones où poussent les laminaires. La coquette est hermaphrodite protogyne, c'est-à-dire que les organes femelles viennent à maturité avant les organes mâles, sa robe se modifiant donc au cours de sa vie. C'est un poisson très agressif.



Robe

Elle est très variable selon les spécimens et beaucoup plus claire chez la femelle que chez le mâle. La première a le corps orangé ou rouge et présente des taches noires à la base de la dorsale. Le second est brun-jaune ou brun orangé avec des stries outremer.

Comment l'appelle-t-on en France ?

Demoiselle, vieille rayée, violon (Manche) ; gôgez, courrier, labre mélé (Atlantique) ; cleioun, limbert, roucaou, roussignau, verdoun, tenea (Méditerranée) ; merla gadigua (Corse).

Et dans les autres pays ?

Liptisch (Allemagne) ; striped wrass, cuckoo wrass (Angleterre) ; txibitu, gallano (Espagne) ; chilou (Grèce) ; coumba, tordo fischietto (Italie) ; smokva (Croatie).

Reproduction

Elle a lieu en avril et mai en Atlantique et en Manche, et du printemps à la fin de l'été en Méditerranée. La coquette mâle construit un nid dans lequel il attire les femelles où elles pondent ; ensuite le mâle féconde les œufs qu'il protège des prédateurs. Après incubation naissent des larves qui se transforment ensuite en alevins ; ces derniers viennent vivre et grandir dans la zone de balancement des marées.



Croissance

La longévité de l'espèce est d'environ une vingtaine d'années, mais la croissance de la coquette est relativement longue : à 2 ans, elle mesure entre 11 cm et 15 cm, à 3 ans

entre 14 cm et 20 cm pour atteindre environ 30 cm lors de sa quatrième année. La taille moyenne des prises est de 20 à 30 cm pour un poids de 1 kg environ ; certains spécimens avoisinent les 40 cm.

Alimentation

La coquette juvénile est à la fois herbivore et carnivore ; puis elle devient totalement carnivore à l'âge de 2 ans. Elle se nourrit essentiellement de crustacés, crevettes et bouquets, et de mollusques univalves ou bivalves dont elle casse facilement les coquilles grâce à sa puissante dentition. C'est un poisson extrêmement vorace.

dans les soupes de poisson ou dans la bouillabaisse.

Les labridés

Cette famille comprend plusieurs espèces, souvent très proches pour ce qui est de la forme du corps ; seules les couleurs, presque toujours vives, permettent de les différencier avec, des erreurs toujours possibles, car la robe varie aussi en fonction des habitats. Néanmoins on peut citer les espèces les plus courantes sur nos côtes : la vieille, *Labrus berggylta*, et le merle, *Labrus merula*.

Gastronomie

La chair de la coquette n'est pas particulièrement recherchée ; elle est un peu fade. Cependant on en met souvent

Où vit-elle ?

► **Répartition en France**

La coquette vit en Manche, (surtout dans sa partie ouest), en Atlantique et en Méditerranée, où sa présence est cependant relativement modeste, les plus fortes concentrations se situant surtout sur les côtes de Bretagne et de Corse.



Comment la pêcher ?

D'une façon générale, on ne recherche pas ce poisson pour lui-même, mais on le capture en pêchant la vieille avec laquelle il partage les mêmes habitats. En Méditerranée, on prend des coquettes à la palangrotte fine dite "pour poissons à soupe". Partout, la coquette se pêche à

des montages fins, à condition d'avoir des profondeurs égales ou supérieures à 10 m. La période de pêche où l'on prend le plus ce poisson va du milieu du printemps à la fin de l'automne. Quand les eaux se rafraîchissent les coquettes gagnent des fonds plus importants où il devient difficile de les trouver.