



LEPIDOPTERA
DIURNES

Ordre : **Lepidoptera**

Famille : **Pieridae**

Nom latin : ***Ascia monuste***

Nom français : **Piéride craie**

UICN : **LC - Préoccupation mineure**



DESCRIPTION

- Papillon blanc.
- De taille moyenne (43-53 mm).
- Dessus blanc crayeux.
- Marge noire aux ailes antérieures, plus large chez la femelle.
- Dessous blanc, à l'exception de l'aile postérieure et de l'apex de l'aile antérieure qui sont jaunes pâles.
- Extrémité des antennes (massue) bleu turquoise.

Classes
de taille





RÉPARTITION MONDIALE

- Sud des États-Unis à l'Amérique du Sud y compris en Amérique Centrale et la Caraïbe.



GADELOUPE

- Très commune.
- Dans tout l'archipel guadeloupéen.



- Du niveau de la mer jusqu'en altitude.
- Plus présente en bordure du littoral et dans les prairies sèches.



Chenille



PLANTE-HÔTE Chenille

- Différentes espèces des familles Brassicaceae et Capparaceae comme Bwa mabouj *Capparis flexuosa*.



COMPORTEMENT

- L'espèce s'observe parfois en groupe de plusieurs dizaines d'individus.



Plante-hôte *Capparis flexuosa*.

CONFUSION POSSIBLE
Avec la Pièride soie *Glutophrissa drusilla*, elle s'en distingue facilement avec ses massues bleues.



Références bibliographiques

- Brévignon C. & L. Brévignon. 2003. À la découverte des papillons diurnes des Antilles. PLB éditions, Gosier, Guadeloupe, FRANCE. 64 pages.
David G. & P.-D. Lucas. 2017. Atlas des papillons de jour de la Martinique. Association Martinique Entomologie. 139 pages.
David G. & B. Thiébaud. 2012. Les plantes-hôtes des papillons de jour des Antilles françaises. Société d'Histoire Naturelle L'Herminier. 28 pages.
IUCN Comité français, OFB & MNHN. 2021. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitres Faune de Guadeloupe. Paris, France. 36 pages.

