



La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Réalisée selon la méthodologie UICN



Coordination générale :



Liste réalisée par le Conservatoire Botanique d'Alsace (CBA) et la Société Botanique d'Alsace (SBA)

Coordination scientifique : Julie VANGENDT (CBA)

Membres du comité d'évaluation :

Jean-Pierre BERCHTOLD (SBA)
Richard BOEUF (SBA)
Isabelle COMBROUX (Université de Strasbourg et SBA)
Pascal HEITZLER (SBA)
Michel HOFF (SBA)
Pascal HOLVECK (Office National des Forêts et SBA)
Jean-Claude JACOB (SBA)
Alain PIERNE (Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace et SBA)
Jean-Pierre REDURON (SBA)
Reinhold TREIBER
Julie VANGENDT (CBA)

Coordination générale du projet du projet Listes rouges en Alsace :

Office des données naturalistes d'Alsace (ODONAT)

Coordination et assistance méthodologique :

Vadim HEUACKER & Stéphanie KAEMPF (ODONAT), Régis HUET (CBA)

Appui et conseils méthodologiques : Aurore CAVROIS & Florian KIRCHNER (UICN France)

Avec la contribution de :

Pascal AMBLARD (SBA), Sophie AUVERT (Conservatoire Botanique National Bassin Parisien), Yvan BRAHY (SBA), Julien BUCHET (CBN de Bailleul), Yannick DESPERT (Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges), Fabien DUPONT (PNR des Ballons des Vosges, SBA), Guillaume FRIED (Laboratoire de la santé des végétaux - Anses), Johan GOURVIL (Fédération des Conservatoires botaniques nationaux), Etienne HARSTER (SBA), Mathieu HILDENBRAND (Conservatoire botanique du service des Espaces verts de la Ville de Mulhouse), Gerold HÜGIN, Henri MATHÉ (SFO de Lorraine-Alsace et SBA), Léa MERCKLING (RNN Petite Camargue Alsacienne), Serge MULLER (Université de Lorraine, SBA), Dominique OESTERLE (Alsace Nature), Claire PIRAT (SBA), Denis SCHWAB (SBA), Florian SCHALLER (SBA), Véronique SCIUS-TURLOT (Conservatoire botanique du service des Espaces verts de la Ville de Mulhouse), Nicolas SIMLER (CBA), Bernard STOEHR (SBA), Benoît TOUSSAINT (Conservatoire Botanique National de Bailleul), Hugues TINGUY (SBA), Michèle TRÉMOLIÈRES (Université de Strasbourg et SBA).

Avis favorable émis par l'UICN le 15 janvier 2014



Avis favorable émis par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel le 22 mai 2014

Source des données utilisées :

Brunfels : base de la *Société Botanique d'Alsace*

SOPHY : base l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (AIAB) versée dans la base de données Brunfels. Les données ont été fournies par la Société botanique d'Alsace

Base de données de l'*Herbier de Strasbourg*

BD_HTinguy : base personnelle de *Hugues Tinguy*

Base de la *Société Française d'Orchidophilie Lorraine-Alsace*

Données de l'*Office National des Forêts*

Données du *Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de l'université de Strasbourg*

Données alsaciennes de *Tela Botanica* de *J.-M. Ringenbach, T. Schlienger, G. Fried*

Données personnelles de *Reinhold Treiber*

Données de la *Communauté Urbaine de Strasbourg*

Données du *Parc Naturel Régional des Vosges du Nord*

Données du *Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges*

Données du *Conseil Général du Bas-Rhin*

Données personnelles de *Denis Schwab*

Rédaction du document : Julie VANGENDT (CBA)

Citation des résultats : VANGENDT J., BERCHTOLD J.-P., JACOB J.-C., HOLVECK P., HOFF M., PIERNE A., REDURON J.-P., BOEUF R., COMBROUX I., HEITZLER P., TREIBER R., 2014. La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace. CBA, SBA, ODONAT, 96 p. Document numérique.

Photographies de couverture : Richard BOEUF (*Carex hartmanii*¹), Pascal HOLVECK (*Polystichum braunii*³), Julie VANGENDT (*Gratiola officinalis*², *Trollius europaeus*⁴, *Linum tenuifolium*⁵)

Etablir une Liste rouge vise à dresser un bilan du degré de menace pesant sur les espèces à l'échelle d'un territoire donné. L'objectif est de mesurer le risque de disparition des espèces qui s'y reproduisent en milieu naturel ou qui y sont régulièrement présentes.

La première Liste rouge des plantes vasculaires d'Alsace avait été établie par la Société Botanique d'Alsace et publiée par l'Office des Données Naturalistes d'Alsace en 2003 (SBA in ODNAT, 2003). Dix ans après, dans le cadre du projet de réactualisation de l'ensemble des Listes rouges alsaciennes coordonné par ODNAT, la réalisation de la Liste rouge de la flore vasculaire a été confiée au Conservatoire Botanique d'Alsace (CBA) en partenariat avec la Société Botanique d'Alsace (SBA). Des collaborations avec la Société Française d'Orchidophilie de Lorraine-Alsace (SFOLA), l'Office National des Forêts (ONF) et l'Université de Strasbourg (UDS) ont également permis de mener à bien cette mission.

Cette Liste rouge a été élaborée d'après la méthodologie mise au point par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN, 2001), dans le respect des lignes directrices fixées pour l'application de la méthodologie au niveau régional (UICN, 2003). Elle se veut exhaustive, c'est-à-dire que l'évaluation porte sur l'ensemble des espèces de plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) connues à ce jour en Alsace, ainsi que sur certains taxons de rang infraspécifique (sous-espèces ou variétés), porteurs d'enjeux particuliers.

Origine des données

Les données rassemblées pour l'évaluation ont été collectées auprès des sources suivantes :

- Brunfels - base de la Société Botanique d'Alsace-, base de l'herbier de Strasbourg et base Sophy (306907 données)
- BD HTinguy : base personnelle de Hugues Tinguy (133722 données)
- Base de la Société Française d'Orchidophilie Lorraine Alsace (1185 données)
- Données de l'Office National des Forêts (37723 données)
- Données du Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de l'université de Strasbourg (6667données)
- Données alsaciennes de Tela Botanica pour trois botanistes (JM. Ringenbach, T. Schlienger, G. Fried, 4167 données)
- Données personnelles de Reinhold Treiber (3397 données)
- Données de la Communauté Urbaine de Strasbourg (1676 données)
- Données du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (674 données)
- Données du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (568 données)
- Données du Conseil Général du Bas-Rhin (469 données)
- Données personnelles de Denis Schwab (267 données)

Soit un corpus de 417793 données, renseignées dans des référentiels taxonomiques hétéroclites et à divers niveaux de précision géographique et temporel. Un important travail d'homogénéisation a donc été nécessaire afin de les rassembler dans un format unique destiné aux évaluations.

Un effort particulier a également porté sur l'amélioration de la précision géographique, l'actualisation et la correction des données ainsi que sur la recherche de données d'effectifs et de tout élément permettant d'obtenir une image fidèle de la situation actuelle et passée de l'espèce dans la région. Ces recherches complémentaires ont été conduites auprès de nombreux botanistes locaux et sur la base de bibliographie.

Nomenclature

Pour s'attacher à la réalisation de la Liste rouge, il a fallu d'abord élaborer un catalogue des taxons connus en Alsace. Celui-ci reprend l'ensemble des taxons cités dans les données collectées et a été réalisé sur la base du référentiel taxonomique TAXREF v4.0, le référentiel taxonomique de la faune, la flore et la fonge de France métropolitaine et d'outre-mer, en vigueur au commencement du travail d'évaluation. Ce référentiel est issu d'un partenariat entre le MNHN, Tela Botanica, le Ministère chargé de l'Ecologie et la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux pour les listes de référence de la flore vasculaire¹. Vingt-trois taxons non repris dans Taxref ont également été ajoutés.

Ainsi que le recommande le Guide pratique (UICN, 2011), le rang taxonomique d'évaluation a été par défaut le niveau espèce. En supplément, certaines sous-espèces ou variétés ont également été évaluées indépendamment lorsqu'elles présentaient « une valeur patrimoniale ou (étaient) porteuses d'enjeux particuliers ». Lorsque cela n'était pas le cas, les données des taxons infraspécifiques (sous-espèces, variétés, formes) étaient versées à celles de l'espèce de rattachement pour l'évaluation et sont affectées par extension de la catégorie de menace de l'espèce. Les hybrides fixés et référencés ont également été pris en compte dans la démarche.

Les statuts d'indigénat et de présence sont basés par défaut sur le référentiel du Rhin supérieur (HOFF, 2012) et sur la Liste des plantes indigènes, naturalisées, introduites et cultivées en Alsace (Herbier de l'UDS et SBA, 2013) amplement complétés et amendés par la synthèse de sources bibliographiques, l'examen des données et des recherches complémentaires. Ce travail a permis de différencier les taxons non présents, douteux, récemment ou non établis dans la région, des taxons indigènes, présumés indigènes ou naturalisés.

Démarche d'évaluation

Le catalogue des taxons d'Alsace regroupe 3515 taxons dont 2629 espèces, 613 sous-espèces, 98 variétés, 9 formes et 166 hybrides. Parmi ceux-ci, 342 ont été écartés car cités par erreur ou sans données fiables. 3173 taxons dont 2401 espèces ont été confrontés à la méthodologie de l'UICN.

1018 taxons dont 856 espèces ont été classés dans la catégorie "Non applicable" [NA] qui regroupe les taxons pour lesquels la méthodologie UICN d'évaluation du risque de disparition n'est pas adaptée. Plusieurs cas de figure y sont regroupés : des taxons cultivés ou présents uniquement dans les habitats anthropisés et dont les populations sont éphémères, des taxons introduits après 1900 ou originaires du nouveau monde et des taxons dont le statut d'indigénat n'a pas pu être déterminé avec certitude lors de la démarche.

Ce document indique, pour les 1545 espèces évaluées en catégories LC, NT, VU, EN, CR, RE ou DD le ou les critères de l'UICN retenus. Les espèces présumées disparues pour lesquelles nous ne disposons pas de donnée récente ou celles dont toutes les stations modernes connues ont disparu mais dont la disparition totale n'est pas certaine sont classées CR*.

Conformément aux préconisations de l'UICN, les 39 sous-espèces, les 6 variétés et les 34 hybrides ayant fait l'objet d'une évaluation particulière sont présentés dans un tableau à part. Les sous-espèces, variétés et formes non évaluées indépendamment de leur espèce de rattachement ne sont pas reprises ici.

¹ Le référentiel taxonomique national est publié dans le cadre de l'Inventaire national du patrimoine naturel <http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref>

Des commentaires ont été jugés indispensables à la bonne compréhension de la catégorie de menace retenue pour certains taxons et sont indiqués dans ce document.

Critères (voir l'annexe 1)

Le critère B de répartition géographique a été le plus utilisé. Les données recueillies permettaient en effet de calculer l'aire d'occupation du taxon (assimilé au nombre de mailles de 1km dans lesquelles le taxon est signalé) et de vérifier les conditions de rareté, de fragmentation, de déclin ou de fluctuations des populations.

Le « déclin continu » a été apprécié en comparant la situation du taxon dans la période dite ancienne (1950-1989) avec la période dite moderne (1990-2012) à partir d'indicateurs cartographiques, quantitatifs (nombre de stations ou effectifs) ou bibliographiques.

Conformément aux préconisations de l'UICN, La condition de « fragmentation sévère » de l'aire de répartition a été retenue uniquement s'il a été estimé que la fragmentation découlait d'un processus d'origine anthropique documenté empêchant les flux génétiques nécessaires à la survie des différentes populations régionales de l'espèce et que les taxons concernés possédaient des capacités faibles de dispersion, les rendant naturellement plus sensibles à la fragmentation de leurs habitats (CHAURAND, 2011).

Le critère D2 a également pu être utilisé pour les taxons ayant une aire d'occupation restreinte et pour lesquels une menace précise a pu être identifiée.

Les critères C (petite population et déclin) et D1 (très petite population) ont pu être utilisés lorsque des données d'effectifs fiables des populations régionales ont pu être rassemblées.

Le critère A de réduction de la population n'a été utilisé qu'à de rares exceptions car il nécessite de considérer l'évolution de la situation du taxon soit sur les dix dernières années (pas de temps souvent trop court par rapport à la précision de nos données), soit sur trois générations (manque d'information sur les traits d'histoires de vie).

Le critère E nécessite de quantifier une probabilité d'extinction et n'a pas été utilisé dans ce travail.

Les catégories UICN pour la Liste rouge

RE Regionaly Extinct : Taxon disparu d'Alsace

Taxons menacés de disparition en Alsace :

CR	Critically Endangered : En danger critique (CR* : présumé disparu)
EN	Endangered : En danger
VU	Vulnerable : Vulnérable

Autres catégories :

NT, Near Threatened: Quasi menacé (taxon proche du seuil des taxons menacés ou qui pourrait être menacé si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises).

LC, Least Concern : Préoccupation mineure (taxon pour lequel le risque de disparition d'Alsace est faible).

DD, Data Deficient : Données insuffisantes

NA, Not Applicable: Non applicable (taxon non soumis à évaluation car non indigène ou naturalisé en Alsace)

Commentaires pour la bonne compréhension de la catégorie de menace retenue :

Mesures ! : Taxon ayant fait l'objet d'efforts de conservation. La catégorie de menace est le reflet de l'état actuel des populations qui ont profité de ces mesures, et en sont dépendantes pour leur survie.

Cultivé ! : Taxon pouvant être cultivé. La catégorie de menace s'applique uniquement aux populations spontanées confirmées et spécifiées lors de l'évaluation.

Répartition ! : Taxon plus menacé dans une partie du territoire régional (petites régions naturelles, terroirs biogéographiques...) qu'à l'échelle de la région entière.

Résultats

Nombre d'espèces évaluées par catégorie UICN

Catégorie UICN	Nombre de taxons
RE	29
CR	76
EN	179
VU	184
NT	115
LC	858
DD	104
Nombre total d'espèces évaluées	1545

NA	758
----	-----


Nombre total d'espèces	2303
------------------------	-------------

Sur les 1545 espèces évaluées, 439 sont inscrites sur Liste rouge, soit 28.4% des espèces évaluées. Ce pourcentage important est représentatif des grandes transformations subies par les milieux naturels en Alsace, en particulier dans la seconde moitié du XX^{ème} siècle.

Parmi les 76 espèces « CR », il est à noter que 33 sont présumées disparues, notées « CR* ».

115 espèces sont cotées « NT », dont plus de 80% sur la base du critère D2, c'est-à-dire qu'une menace est identifiée mais que la zone d'occupation est légèrement supérieure aux seuils quantitatifs de la méthodologie UICN.

104 espèces sont classées dans la catégorie « DD », car les informations réunies sont insuffisantes pour la détermination d'un risque de disparition. Parmi celles-ci, les genres *Alchemilla*, *Hieracium* et *Rubus* sont sur-représentés avec respectivement 11, 16 et 20 espèces. De plus, le statut d'indigénat de 94 espèces classées dans la catégorie « NA » n'a pas pu être déterminé avec certitude et reste à étudier. Ainsi, plusieurs axes prioritaires pour l'amélioration de la connaissance de la flore vasculaire d'Alsace ont pu être identifiés au cours de la démarche d'évaluation.



Nombres et proportions des 1545 espèces de flore vasculaire d'Alsace évaluées par catégories UICN.

Nombre de taxons infraspécifiques (sous-espèces, variétés et formes) évaluées indépendamment de leur espèce de rattachement, par catégorie UICN

Catégorie UICN	Nombre de taxons
CR	3
EN	5
VU	13
NT	4
LC	8
DD	12
Nombre total de taxons évalués	45

NA	46
----	----

Nombre total de taxons	91
-------------------------------	-----------

Nombre d'hybrides évalués par catégorie UICN

Catégorie UICN	Nombre d'hybrides
CR	1
EN	0
VU	2
NT	2
LC	4
DD	24
Nombre total d'hybrides évalués	34

NA	44
----	----

Nombre total d'hybrides	78
--------------------------------	-----------

La liste est consultable selon plusieurs classements :

- par catégorie UICN : p. 9
 - espèces des catégories RE, CR, EN VU, NT, DD
 - taxons infraspécifiques évalués indépendamment de leur espèce de rattachement
 - hybrides des catégories RE, CR, EN VU, NT, DD
- par ordre alphabétique des noms scientifiques (toutes catégories) : p. 29

Liste par catégorie UICN

Espèces des catégories RE, CR, EN VU, NT, DD

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Asperugo procumbens L., 1753	RE		
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr., 1859	RE		
Caldesia parnassifolia (L.) Parl., 1860	RE		
Carex dioica L., 1753	RE		
Carpesium cernuum L., 1753	RE		
Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton, 1817	RE		
Cuscuta epilinum Weihe, 1824	RE		
Cypripedium calceolus L., 1753	RE		
Daphne cneorum L., 1753	RE		
Dianthus gratianopolitanus Vill., 1789	RE		
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, 1975	RE		
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949	RE		
Filago neglecta (Soy.-Will.) DC., 1838	RE		
Gentiana utriculosa L., 1753	RE		
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, 1891	RE		
Laserpitium prutenicum L., 1753	RE		
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799	RE		
Linaria arvensis (L.) Desf., 1799	RE		
Moneses uniflora (L.) A.Gray, 1848	RE		
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, 1874	RE		
Polycnemum arvense L., 1753	RE		
Pyrola chlorantha Sw., 1810	RE		
Ranunculus hederaceus L., 1753	RE		
Salvinia natans (L.) All., 1785	RE		
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla, 1888	RE		
Sisymbrium strictissimum L., 1753	RE		
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817	RE		
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814	RE		
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965	RE		
Adonis flammea Jacq., 1776	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Androsace maxima L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Asperula arvensis L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, 1827	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Bupleurum rotundifolium L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler, 1802	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Caucalis platycarpos L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Crepis tectorum L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Cyperus flavescens L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Drosera intermedia Hayne, 1798	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Elatine alsinastrum L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Euphorbia falcata L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Filago gallica L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Helichrysum arenarium (L.) Moench, 1794	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Illecebrum verticillatum L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Lactuca saligna L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Leontodon incanus (L.) Schrank, 1786	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Liparis loeselii (L.) Rich., 1817	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Lolium temulentum L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Neslia apiculata Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall., 1842	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Pilularia globulifera L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Pulsatilla vernalis (L.) Mill., 1768	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Radiola linoides Roth, 1788	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Rumex pulcher L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Silene otites (L.) Wibel, 1799	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Spergula pentandra L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Spergularia segetalis (L.) G.Don, 1831	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Trifolium spadiceum L., 1755	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Allium suaveolens Jacq., 1789	CR	B2ab(i,ii,iii,iv)	mesures!
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	CR	B2ab(i,ii,iv,v)+ D1	
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	CR	D1	
Androsace halleri L., 1753	CR	D1	mesures!
Anemone narcissiflora L., 1753	CR	B2ab(i,ii,iv,v) + D1	
Arabis auriculata Lam., 1783	CR	B2ab(ii,iv)	
Astragalus danicus Retz., 1783	CR	D1	
Athamanta cretensis L., 1753	CR	D1	
Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch, 1846	CR	D1 + C2a(i)	
Coronilla vaginalis Lam., 1786	CR	D1	
Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848	CR	B(1+2)ab(i,ii,iv) + D1	
Elatine hydropiper L., 1753	CR	B2ab(ii,iv)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth, 1806	CR	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin, 1828	CR	B(1+2)ab(iii,v)	
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	CR	B(1+2)ab(i,ii,iv) + D1	
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br., 1813	CR	B2ab(i,ii,iv)c(iv)	
<i>Hieracium alpinum</i> L., 1753	CR	B(1+2)ab(iii,v) + D1	
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	CR	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	CR	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800	CR	B(1+2)ab(i,iii)	
<i>Leucojum aestivum</i> L., 1759	CR	B2ab(i,ii,iii,iv) + D1	cultivé!
<i>Lonicera alpigena</i> L., 1753	CR	D1	
<i>Marrubium vulgare</i> L., 1753	CR	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Moenchia erecta</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	CR	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	CR	B(1+2)ab(ii,iv)	
<i>Nigella arvensis</i> L., 1753	CR	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC., 1821	CR	B(1+2)ab(ii,iv)	
<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	CR	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Ophrys araneola</i> Rchb., 1830	CR	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv) + C2b	
<i>Orchis pallens</i> L., 1771	CR	A1a + D1	
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	CR	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	CR	D1	
<i>Polycnemum majus</i> A.Braun, 1841	CR	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fée, 1852	CR	D1	
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth, 1799	CR	D1	
<i>Pyrola media</i> Sw., 1804	CR	B(1+2)ab(ii,iv)	
<i>Rhodiola rosea</i> L., 1753	CR	D1	
<i>Salix repens</i> L., 1753	CR	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) + D1	
<i>Sedum cepaea</i> L., 1753	CR	B(1+2)ab(i,ii,iv,v)	
<i>Sium latifolium</i> L., 1753	CR	D1	
<i>Sparganium minimum</i> Wallr., 1840	CR	D1	
<i>Veronica longifolia</i> L., 1753	CR	B2ab(iii)	
<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791	CR	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv,v) + D1	
<i>Adonis aestivalis</i> L., 1762	EN	B(1+2)b(i,ii,iii,iv)c(iii,iv) + C2ab	
<i>Agrostemma githago</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	EN	B(1+2)b(iii)c(iii,iv)	
<i>Alchemilla hoppeana</i> (Rchb.) Dalla Torre, 1882	EN	D1	
<i>Alchemilla pallens</i> Buser, 1892	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Allium lusitanicum</i> Lam., 1783	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Allium rotundum</i> L., 1762	EN	C2a(i)	
<i>Alyssum montanum</i> L., 1753	EN	B2ab(v) + D1	
<i>Andromeda polifolia</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii,iv,v)	
<i>Anthemis cotula</i> L., 1753	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Artemisia alba</i> Turra, 1764	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Asperula tinctoria</i> L., 1753	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	EN	D1	
<i>Biscutella laevigata</i> L., 1771	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Bupleurum longifolium</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii,iv)	
<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	EN	A4e	cultivé!
<i>Campanula cervicaria</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam., 1785	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Carex bohémica</i> Schreb., 1772	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)(-1)	cultivé!
<i>Carex davalliana</i> Sm., 1800	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With., 1787	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Carex diandra</i> Schrank, 1781	EN	B2ab(i)	
<i>Carex fritschii</i> Waisb., 1895	EN	B(1+2)ab(iii,v)	
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	EN	D1	
<i>Centaurea alpestris</i> Hegetschw., 1839	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Chenopodium murale</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv)c(iii,iv)(-1)	
<i>Chenopodium vulvaria</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)c(ii,iii)	
<i>Cicuta virosa</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet, 1983	EN	B2ab(ii,iii,iv,v)	
<i>Consolida regalis</i> Gray, 1821	EN	B2b(ii,iii,iv)c(iv)	
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel., 1760	EN	D1	
<i>Corrigiola litoralis</i> L., 1753	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Corydalis intermedia</i> (L.) Mérat, 1812	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl., 1822	EN	D1 (-1)	
<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Walther, 1802	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó, 1962	EN	C2a(i)	
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	EN	C2a(i)	
<i>Dianthus deltoides</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Dianthus superbus</i> L., 1755	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub, 1975	EN	A2ac	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Diphasiastrum zeileri</i> (Rouy) Holub, 1975	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv,v)	
<i>Draba aizoides</i> L., 1767	EN	B2ab(iii)	
<i>Draba muralis</i> L., 1753	EN	C2b	
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808	EN	B(1+2)ab(i,iii)c(iv)(-1)	
<i>Elatine triandra</i> Schkuhr, 1791	EN	B(1+2)b(i,iii)c(iv)(-1)	
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800	EN	D1	
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921	EN	B2b(iii)c(iv)	
<i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv) + D1	
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich., 1797	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck, 1794	EN	B2ab(iv,v)	
<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin, 1811	EN	B(1+2)ab(i,iii,v)	
<i>Filago pyramidata</i> L., 1753	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827	EN	C2a(i)	
<i>Galatella linoisyris</i> (L.) Rchb.f., 1854	EN	B2b(iii)c(iv)	
<i>Galium parisiense</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Galium tricornutum</i> Dandy, 1957	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii,v)	mesures!
<i>Gentiana verna</i> L., 1753	EN	D1	mesures!
<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh., 1796	EN	B2ab(iii)*	mesures!
<i>Geranium lucidum</i> L., 1753	EN	D1	
<i>Geranium palustre</i> L., 1756	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr., 1869	EN	B2ab(i,iii)	
<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	EN	B2ab(iii)*	
<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii,v)	mesures!
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851	EN	D1	
<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	EN	B(1+2)b(i,iii)c(iv)	
<i>Hieracium auriculoides</i> Láng, 1824	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Hieracium humile</i> Jacq., 1777	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Hieracium prenanthoides</i> Vill., 1779	EN	B(1+2)ab(ii,iv,v)	
<i>Hieracium vogesiacum</i> (Kirschl.) Moug. ex Fr., 1848	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	EN	B(1+2)b(iii)c(iii)	
<i>Iberis amara</i> L., 1753	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Inula hirta</i> L., 1753	EN	C2a(i)	
<i>Iris sibirica</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii,v)	mesures!
<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Kadenia dubia</i> (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom., 1986	EN	B(1+2)ab(i,iii,ii,iv)	mesures!
<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808	EN	B(1+2)ab(iii)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	EN	B2ab(i,ii,iv)c(iv)	
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., 1827	EN	B2ac(ii,iii) (-1)	
<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
<i>Lathyrus palustris</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii)	
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	EN	B(1+2)b(iii,iv) c(iv)	
<i>Limosella aquatica</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Lindernia palustris</i> Hartmann, 1767	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	EN	B2ac(iv)	mesures!
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	EN	B(1+2)b(ii,iv)c(iv)	
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	EN	B(1+2)b(ii,iv)c(iv)	
<i>Marsilea quadrifolia</i> L., 1753	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
<i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii)	
<i>Melica transilvanica</i> Schur, 1866	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill, 1963	EN	B2b(iii)c(iv)	
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840	EN	B2b(iii)c(iv)	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt, 1794	EN	D1	
<i>Myosurus minimus</i> L., 1753	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
<i>Noccaea montana</i> (L.) F.K.Mey., 1973	EN	B2ab(iii,v)	
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891	EN	B2ab(ii,iii,iv)	
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811	EN	B(1+2)b(i,iii)c(iv)	
<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	EN	B2ab(ii,iii)	mesures!
<i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Coleman, 1844	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	EN	B2ab(ii,iii)	
<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778	EN	C2a(i)	
<i>Ophrys elatior</i> Gump. ex Paulus, 1996	EN	B(1+2)ab(iii)c(iv)	mesures!
<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Orthilia secunda</i> (L.) House, 1921	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Papaver hybridum</i> L., 1753	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	EN	B2ab(i,ii,iv) + D1	
<i>Phelipanche ramosa</i> (L.) Pomel, 1874	EN	D1 + B2ac(iii,v)	
<i>Phleum paniculatum</i> Huds., 1762	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link, 1818	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr., 1845	EN	B(1+2)b(ii,iv)c(iv)	
<i>Potentilla alba</i> L., 1753	EN	B2ab(iii)	
<i>Potentilla alsatica</i> T.Gregor, 2004	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Beck ex Fritsch, 1897	EN	B2ab(iii)	
<i>Potentilla heptaphylla</i> L., 1755	EN	B2ab(iii)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Potentilla rupestris</i> L., 1753	EN	B2ab(iii)	
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	EN	B2ab(ii,iii,iv)c(iv)	
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	EN	B(1+2)ab(iii)	répartition!
<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753	EN	B(1+2)b(i,iii)c(iv)	
<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Rhamnus alpina</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv) + D1	
<i>Rosa gallica</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Rumex maritimus</i> L., 1753	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
<i>Salix daphnoides</i> Vill., 1779	EN	C2a(i)	
<i>Salvia glutinosa</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Saxifraga paniculata</i> Mill., 1768	EN	C2a(i)	
<i>Saxifraga rosacea</i> Moench, 1794	EN	B(1+2)ab(ii,iv)	
<i>Scabiosa lucida</i> Vill., 1779	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Scheuchzeria palustris</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii,iv)	
<i>Sclerochloa dura</i> (L.) P.Beauv., 1812	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Sedum alpestre</i> Vill., 1779	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Sedum dasyphyllum</i> L., 1753	EN	D1	
<i>Sedum villosum</i> L., 1753	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Seseli annuum</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Sibbaldia procumbens</i> L., 1753	EN	D1	
<i>Silene conica</i> L., 1753	EN	B2ac(iii,iv)	
<i>Sonchus palustris</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii,v) + C2a(i,ii)	
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz, 1763	EN	D1	
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763	EN	B(1+2)b(i,iii)c(iv)	
<i>Stellaria palustris</i> Retz., 1795	EN	B(1+2)ab(iii)	mesures!
<i>Stipa pennata</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC., 1805	EN	D1	
<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B.Nord., 1978	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv,v)	mesures!
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii)	
<i>Thalictrum simplex</i> L., 1767	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Thesium linophyllum</i> L., 1753	EN	B2ab(iii)	
<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr., 1788	EN	B(1+2)ab(i,iii)	
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb., 1842	EN	C2a(i)	
<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Triglochin palustre L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii)	
Trinia glauca (L.) Dumort., 1827	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	mesures!
Tulipa sylvestris L., 1753	EN	A2a	
Typha minima Funck, 1794	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	
Utricularia bremii Heer ex Köll., 1839	EN	B(1+2)ab(iii)	
Veratrum album L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
Veronica acinifolia L., 1762	EN	B2ab(i,ii,iv)	
Veronica dillenii Crantz, 1769	EN	B2ab(ii,iii,iv)	
Veronica fruticans Jacq., 1762	EN	B(1+2)ab(iii) + D1	
Veronica opaca Fr., 1819	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
Veronica prostrata L., 1762	EN	C2a(ii)	mesures!
Veronica spicata L., 1753	EN	B2ab(iii)*	
Viola elatior Fr., 1828	EN	B2ab(ii,iii,iv)	
Viola persicifolia Schreb., 1771	EN	B(1+2)ab(i,iii)	
Viola pumila Chaix, 1785	EN	B2ab(ii,iii,iv)	
Viscaria vulgaris Bernh., 1800	EN	B2ab(iii)	
Achillea nobilis L., 1753	VU	C2a(i) + D2	
Adonis vernalis L., 1753	VU	D(1+2)	mesures!
Alchemilla flabellata Buser, 1891	VU	D2	
Allium angulosum L., 1753	VU	D2	
Allium carinatum L., 1753	VU	D2	
Allium nigrum L., 1762	VU	D2	
Alopecurus rendlei Eig, 1937	VU	D2	
Althaea hirsuta L., 1753	VU	C2b	
Anemone sylvestris L., 1753	VU	D2+ B(1+2)ab(iii)	
Aphanes australis Rydb., 1908	VU	D2	
Arabis alpina L., 1753	VU	D(1+2)	
Arabis turrita L., 1753	VU	D2	
Astragalus cicer L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) + D2	
Barbarea intermedia Boreau, 1840	VU	D2	
Bartsia alpina L., 1753	VU	D(1+2)	
Bidens radiata Thuill., 1799	VU	D2	
Blackstonia acuminata (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933	VU	D2	
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762	VU	D2	
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905	VU	D2	
Bunium bulbocastanum L., 1753	VU	D2	
Buphthalmum salicifolium L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,iii) + D2	mesures!
Calendula arvensis L., 1763	VU	D2 + B(1+2)ab(ii,iii,iv)	cultivé!
Calla palustris L., 1753	VU	D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC., 1821	VU	D2 + B2ab(iii)c(iv)	
<i>Campanula baumgartenii</i> Becker, 1827	VU	B(1+2)ab(ii,iv) + D2	
<i>Campanula latifolia</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Campanula patula</i> L., 1753	VU	C2a(i)	
<i>Cardamine dentata</i> Schult., 1809	VU	D2	
<i>Carduus defloratus</i> L., 1759	VU	D2	
<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb., 1803	VU	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	mesures!
<i>Carex distans</i> L., 1759	VU	B(1+2)ab(iii) + D2	
<i>Carex frigida</i> All., 1785	VU	D2	
<i>Carex hartmanii</i> Cajander, 1935	VU	D2	
<i>Carex hordeistichos</i> Vill., 1779	VU	D2	
<i>Carex hostiana</i> DC., 1813	VU	D2	
<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	VU	D2	
<i>Carex limosa</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Carex pauciflora</i> Lightf., 1777	VU	D2	mesures!
<i>Carex praecox</i> Schreb., 1771	VU	D2	
<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	VU	D2	répartition!
<i>Carlina acaulis</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Carlina biebersteinii</i> Bernh. ex Hornem., 1819	VU	D(1+2)	
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv., 1812	VU	B(1+2)ab(i,iii) + D2	
<i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763	VU	D2	
<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm., 1800	VU	B(1+2)ab(i,ii,iv)(-1)	
<i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	VU	B2ab(iii) + D2	mesures!
<i>Colutea arborescens</i> L., 1753	VU	D2	mesures! / cultivé!
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	VU	D2	
<i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay ex Guss., 1844	VU	D2	cultivé!
<i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter, 1970	VU	D2	
<i>Crocus albiflorus</i> Kit., 1814	VU	D2	
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl, 1891	VU	B(1+2)b(ii,iii,iv)c(iv)(-1)	
<i>Dictamnus albus</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub, 1975	VU	D2	
<i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub, 1975	VU	D2	
<i>Diphasiastrum oellgaardii</i> Stoor, Boudrie, Jérôme, K.Horn & Bennert, 1996	VU	D2	
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC., 1821	VU	D2	
<i>Doronicum pardalianches</i> L., 1753	VU	pr.D2	cultivé!
<i>Empetrum nigrum</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,iii) + D2	
<i>Epilobium nutans</i> F.W.Schmidt, 1794	VU	D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	VU	B(1+2)b(ii,iii)c(iv)(-1)	
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799	VU	D2	
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	VU	D2	
<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Euphrasia picta</i> Wimm., 1857	VU	D2	
<i>Festuca airoides</i> Lam., 1788	VU	D2	
<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	VU	D2	
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	VU	D2	
<i>Filago arvensis</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,iii) + D2	
<i>Filago lutescens</i> Jord., 1846	VU	D2	
<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet, 1984	VU	D2	
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	VU	B(1+2)ab(iii) + D2	
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809	VU	B(1+2)ab(i,iii)	
<i>Galium glaucum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Gentiana cruciata</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) + D2	
<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner, 1912	VU	B(1+2)ab(iii,v)	
<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv,v)	
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	VU	D2	
<i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753	VU	D2 + B(1+2)ab(iii)	
<i>Hieracium bauhinii</i> Schult., 1809	VU	D2 + B(1+2)ab(iii)	
<i>Hieracium intybaceum</i> All., 1773	VU	D2	
<i>Hieracium inuloides</i> Tausch, 1837	VU	D2	
<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat, 1812	VU	D2 + B2ab(ii,iii,iv)	
<i>Hieracium racemosum</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1803	VU	D2	
<i>Hieracium schmidtii</i> Tausch, 1828	VU	D2 + B2ab(i,ii,iv)	
<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Holandrea carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997	VU	D2	
<i>Honorius nutans</i> (Sm.) Gray, 1821	VU	D2 + B(1+2)ab(iii)	cultivé!
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	VU	D2	
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	VU	B2ab(i,iii) + D2	
<i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(iii)	
<i>Inula britannica</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Jacobaea erratica</i> (Bertol.) Fourr., 1868	VU	B2ab(iii)+ D2	
<i>Jasione laevis</i> Lam., 1779	VU	B2ab(i) + D2	
<i>Juncus filiformis</i> L., 1753	VU	D2 + B2ab(v)	
<i>Leonurus cardiaca</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Lepidium squamatum</i> Forssk., 1775	VU	B(1+2)ab(i,iii) + D2	
<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988	VU	D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod., 1866	VU	D1	
<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844	VU	D2	répartition!
<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819	VU	D2	
<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv., 1824	VU	D2	
<i>Najas minor</i> All., 1773	VU	D2	
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	VU	D1	
<i>Nepeta cataria</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iv) + D2	cultivé!
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	VU	C2b	
<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl., 1836	VU	D(1+2)	mesures!
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	VU	B2ab(i,iii) + D2	
<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828	VU	D2	
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr., 1825	VU	D2	
<i>Orobanche teucroii</i> Holandre, 1829	VU	D2 + B2ab(iii,iv)	
<i>Papaver argemone</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Pedicularis foliosa</i> L., 1767	VU	D2	
<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják, 1972	VU	D2	
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880	VU	D2	
<i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Plantago scabra</i> Moench, 1794	VU	D2	
<i>Polemonium caeruleum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	VU	D2 + B(1+2)ab(iii)	
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb., 1804	VU	D2	
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	VU	D2	
<i>Potamogeton compressus</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W.D.J.Koch, 1823	VU	D2	
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	VU	D2	
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schldl., 1827	VU	D2	
<i>Potentilla inclinata</i> Vill., 1788	VU	D2	
<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta, 1982	VU	D2	
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	VU	C2a(i)	
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre, 1800	VU	D2	
<i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Ranunculus rionii</i> Lagger, 1848	VU	D2	
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	VU	D2 + B(1+2)ab(iii)	
<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel., 1806	VU	B2ab(i,ii,iv)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805	VU	D2	
Rosa trachyphylla Rau, 1816	VU	D2	
Rosa villosa L., 1753	VU	D2	
Rumex palustris Sm., 1800	VU	D2	
Salix bicolor Willd., 1796	VU	D(1+2)	
Samolus valerandi L., 1753	VU	D2	
Scabiosa canescens Waldst. & Kit., 1802	VU	D2	
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, 1888	VU	D2	
Schoenoplectus triquetus (L.) Palla, 1888	VU	D2	
Schoenus nigricans L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) + D2	mesures!
Scorzonera humilis L., 1753	VU	D2	
Scrophularia auriculata L., 1753	VU	D2	
Scrophularia vernalis L., 1753	VU	D2	
Scutellaria minor Huds., 1762	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) + D2	
Sedum annuum L., 1753	VU	D2	
Seseli montanum L., 1753	VU	D2	mesures!
Silene noctiflora L., 1753	VU	B(1+2)b(i)c(iv)(-1)	
Spergula morisonii Boreau, 1847	VU	D2	
Stachys germanica L., 1753	VU	D1	
Staphylea pinnata L., 1753	VU	D2	
Stellaria neglecta Weihe, 1825	VU	D2	
Stellaria pallida (Dumort.) Piré, 1863	VU	D2	
Symphytum bulbosum K.F.Schimp., 1825	VU	D2	
Teucrium montanum L., 1753	VU	D2	
Thelypteris palustris Schott, 1834	VU	D2	
Thymus froelichianus Opiz, 1831	VU	D2 + B(1+2)ab(iii)	
Thymus praecox Opiz, 1824	VU	D2	répartition!
Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814	VU	D2	
Trapa natans L., 1753	VU	D2	cultivé!
Trifolium ochroleucon Huds., 1762	VU	D2	
Trifolium rubens L., 1753	VU	D2	
Trollius europaeus L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) + D2	répartition!
Typha angustifolia L., 1753	VU	D2	
Utricularia minor L., 1753	VU	D2	
Utricularia vulgaris L., 1753	VU	D2	
Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776	VU	B2b(i,iii)c(iv)(-1)	
Valerianella eriocarpa Desv., 1809	VU	D2	
Verbascum phlomoides L., 1753	VU	B2ab(i)	
Verbascum pulverulentum Vill., 1779	VU	D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Veronica agrestis</i> L., 1753	VU	B2b(iii)c(iv)(-1)	
<i>Veronica praecox</i> All., 1789	VU	D2	
<i>Veronica verna</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Vicia dumetorum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	VU	B(1+2)b(iii)c(ii,v)(-1)	
<i>Vicia pisiformis</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Aconitum lycoctonum</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Aconitum napellus</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Actaea spicata</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840	NT	pr.D2	
<i>Aira praecox</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	NT	pr.D2	
<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Allium victorialis</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799	NT	pr.D2	
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	NT	pr.B2b(i,ii,iii,iv)	
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn., 1791	NT	pr.D2	
<i>Anthericum ramosum</i> L., 1753	NT	pr.C2a(i)	
<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808	NT	pr.D2	
<i>Aquilegia atrata</i> W.D.J.Koch, 1830	NT	pr.D2	
<i>Arctium tomentosum</i> Mill., 1768	NT	pr.D2	
<i>Asplenium viride</i> Huds., 1762	NT	pr.D2	
<i>Aster amellus</i> L., 1753	NT	pr.A2c	
<i>Athyrium distentifolium</i> Tausch ex Opiz, 1820	NT	pr.D2	
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868	NT	pr.D2	
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw., 1802	NT	pr.D2	
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	NT	pr.B2b(ii,iii,iv)c(iii)	
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	NT	pr.D2	
<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789	NT	pr.D2	mesures!
<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq., 1776	NT	pr.D2	
<i>Carex curta</i> Gooden., 1794	NT	pr.D2	
<i>Carex elongata</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Carex pilosa</i> Scop., 1772	NT	pr.D2	
<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	NT	pr.D2	
<i>Chenopodium rubrum</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Circaea alpina</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772	NT	pr.D2	
<i>Crepis foetida</i> L., 1753	NT	pr.A2c + pr.B2b(i)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Crepis pulchra</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R.Br., 1842	NT	pr.D2	
<i>Daphne laureola</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill., 1768	NT	pr.D2	
<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	NT	pr.D2	
<i>Eleocharis mamillata</i> H.Lindb., 1902	NT	pr.D2	
<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.) Krock., 1787	NT	pr.D2	
<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri, 1818	NT	pr.D2	
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O.E.Schulz, 1916	NT	pr.D2	
<i>Euphorbia palustris</i> L., 1753	NT	pr.B(1+2)b(iii)	
<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	NT	pr.D2	
<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr., 1815	NT	pr.D2	
<i>Festuca duvalii</i> (St.-Yves) Stöhr, 1955	NT	pr.D2	
<i>Fragaria moschata</i> Weston, 1771	NT	pr.D2	
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809	NT	pr.A3e	
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	NT	pr.B2b(iii)	
<i>Hieracium aurantiacum</i> L., 1753	NT	pr.D2	cultivé!
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort., 1827	NT	pr.D2	
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989	NT	pr.B(1+2)b(iii)	
<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	NT	pr.D2 + pr.B(1+2)b(iii)	
<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix, 1785	NT	pr.D2	
<i>Lactuca plumieri</i> (L.) Gren. & Godr., 1850	NT	pr.D2	
<i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753	NT	pr.C2a(i)	
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800	NT	pr.D2	
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779	NT	pr.D2	
<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949	NT	pr.D2	
<i>Lilium martagon</i> L., 1753	NT	pr.A3e	
<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	NT	pr.B2b(iii)	
<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br., 1813	NT	pr.D2	
<i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schult., 1814	NT	pr.D2	
<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936	NT	pr.B(1+2)c(iv)	
<i>Moehringia muscosa</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill., 1768	NT	pr.D2	
<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	NT	pr.A2c	
<i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818	NT	pr.D2	
<i>Najas marina</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Noccaea caerulescens</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey., 1973	NT	pr.D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	NT	pr.D2	
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	NT	pr.D2	mesures!
<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800	NT	pr.D2	
<i>Orobanche minor</i> Sm., 1797	NT	pr.D2	
<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	NT	pr.C2a(i)	
<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	NT	Pr.D2 + pr.B(1+2)b(i,iii)	répartition!
<i>Peucedanum officinale</i> L., 1753	NT	pr.D2	mesures!
<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Polygala amarella</i> Crantz, 1769	NT	pr.D2	
<i>Potamogeton helveticus</i> (G.Fisch.) E.Baumann, 1925	NT	pr.D2	
<i>Pulmonaria mollis</i> Wulfen ex Hornem., 1813	NT	pr.D2	
<i>Pulmonaria montana</i> Lej., 1811	NT	pr.D2	
<i>Pyrola minor</i> L., 1753	NT	pr.A2c	
<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789	NT	pr.D2	
<i>Ribes petraeum</i> Wulfen, 1781	NT	pr.D2	
<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb., 1838	NT	pr.D2	
<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	NT	pr.D2	
<i>Rosa elliptica</i> Tausch, 1819	NT	pr.D2	
<i>Rosa ferruginea</i> Vill., 1779	NT	pr.D2	
<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759	NT	pr.D2	
<i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809	NT	pr.D2	
<i>Rubus saxatilis</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888	NT	pr.D2	
<i>Sedum forsterianum</i> Sm., 1808	NT	pr.D2	
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	NT	pr.D2	
<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	NT	pr.D2	répartition!
<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	NT	pr.D2	cultivé!
<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr., 1858	NT	pr.D2	
<i>Stachys alpina</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	NT	pr.D2	
<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	NT	pr.B2b(iii)c(iv)	
<i>Thalictrum minus</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm., 1849	NT	pr.D2	
<i>Trifolium alpestre</i> L., 1763	NT	pr.B2b(iii)	
<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Trifolium striatum</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	NT	pr.A3e	
<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	NT	pr.B2b(iii)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Viola alba</i> Besser, 1809	NT	pr.B(1+2)b(iii)	
<i>Viola mirabilis</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Viola saxatilis</i> F.W.Schmidt, 1794	NT	pr.D2	
<i>Achillea collina</i> Becker ex Rchb., 1832	DD		
<i>Achillea pannonica</i> Scheele, 1844	DD		
<i>Achillea setacea</i> Waldst. & Kit., 1802	DD		
<i>Alchemilla connivens</i> Buser, 1894	DD		
<i>Alchemilla coriacea</i> Buser, 1891	DD		
<i>Alchemilla demissa</i> Buser, 1894	DD		
<i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr., 1840	DD		
<i>Alchemilla impexa</i> Buser, 1894	DD		
<i>Alchemilla lineata</i> Buser, 1894	DD		
<i>Alchemilla micans</i> Buser, 1893	DD		
<i>Alchemilla obtusa</i> Buser, 1894	DD		
<i>Alchemilla schmidelyana</i> Buser, 1891	DD		
<i>Alchemilla splendens</i> H.Christ ex Favrat, 1889	DD		
<i>Alchemilla strigosula</i> Buser, 1893	DD		
<i>Allium coloratum</i> Spreng., 1825	DD		
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC., 1815	DD		
<i>Arctium nemorosum</i> Lej., 1833	DD		
<i>Callitriche palustris</i> L., 1753	DD		
<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz., 1842	DD		
<i>Cerastium dubium</i> (Bastard) Guépin, 1838	DD		
<i>Clinopodium ascendens</i> (Jord.) Samp., 1913	DD		
<i>Cotoneaster juranus</i> Gand., 1875	DD		
<i>Crocus vernus</i> (L.) Hill, 1765	DD		
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	DD		
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut.) Soó, 1962	DD		
<i>Dryopteris expansa</i> (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy, 1977	DD		
<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986	DD		
<i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski, 1933	DD		
<i>Epilobium duriaei</i> J.Gay ex Godr., 1849	DD		
<i>Euphorbia esula</i> L., 1753	DD		
<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	DD		
<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A.Dietr., 1839	DD		
<i>Hieracium bifidum</i> Kit., 1815	DD		
<i>Hieracium calodon</i> (Tausch) Nägeli & Peter, 1885	DD		
<i>Hieracium comatulum</i> Jord. ex Boreau, 1857	DD		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Hieracium crocatum Fr., 1846	DD		
Hieracium cyaneum Arv.-Touv., 1888	DD		
Hieracium diaphanoides Lindeb., 1882	DD		
Hieracium fallacinum F.W.Schultz, 1844	DD		
Hieracium gothicum Fr., 1848	DD		
Hieracium lanceolatum Vill., 1788	DD		
Hieracium latifolium Froël. ex Link, 1822	DD		
Hieracium laurinum Arv.-Touv., 1879	DD		
Hieracium lycopifolium Froël., 1838	DD		
Hieracium pallidum Biv., 1838	DD		
Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat, 1808	DD		
Hieracium serratifolium Jord. ex Boreau, 1857	DD		
Hieracium similtatum Jord. ex Boreau, 1857	DD		
Knautia gracilis Szabó, 1911	DD		
Malva pusilla Sm., 1795	DD		
Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb., 1832	DD		
Nymphaea alba L., 1753	DD		
Oenothera suaveolens Desf. ex Pers., 1805	DD		
Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800	DD		
Orobanche elatior Sutton, 1798	DD		
Physalis alkekengi L., 1753	DD		
Poa supina Schrad., 1806	DD		
Polypodium interjectum Shivas, 1961	DD		
Potentilla collina Wibel, 1799	DD		
Potentilla neglecta Baumg., 1816	DD		
Potentilla pusilla Host, 1831	DD		
Pyrus nivalis Jacq., 1774	DD		
Ranunculus breyninus Crantz, 1763	DD		
Ranunculus gratiosus Brodtb., 1998	DD		
Ranunculus lingulatus Brodtb., 1998	DD		
Ranunculus polyanthemoides Boreau, 1857	DD		
Rhinanthus glacialis Personnat, 1863	DD		
Ribes nigrum L., 1753	DD		cultivé!
Rosa caesia Sm., 1812	DD		
Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812	DD		
Rosa obtusifolia Desv., 1809	DD		
Rosa vosagiaca Desp., 1828	DD		
Rubus bifrons Vest ex Tratt., 1823	DD		
Rubus cinerascens Weihe ex Lej., 1831	DD		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Rubus divaricatus P.J.Mull., 1858	DD		
Rubus gremlii Focke, 1877	DD		
Rubus hirtus Waldst. & Kit., 1805	DD		
Rubus macrophyllus Weihe & Nees, 1824	DD		
Rubus menkei Weihe, 1825	DD		
Rubus montanus Lib. ex Lej., 1813	DD		
Rubus nessensis Hall, 1794	DD		
Rubus pedemontanus Pinkw., 1898	DD		
Rubus praecox Bertol., 1842	DD		
Rubus pruinosis Arrh.	DD		
Rubus radula Weihe ex Boenn., 1824	DD		
Rubus rhamnifolius Weihe & Nees, 1822	DD		
Rubus rudis Weihe, 1825	DD		
Rubus silvaticus Weihe & Nees, 1824	DD		
Rubus tereticaulis P.J.Mull., 1858	DD		
Rubus thyrsiflorus Weihe, 1825	DD		
Rubus ulmifolius Schott, 1818	DD		
Rubus vestitus Weihe, 1825	DD		
Rumex scutatus L., 1753	DD		
Salix atrocinnerea Brot., 1804	DD		
Salix pentandra L., 1753	DD		
Scleranthus polycarpus L., 1756	DD		
Taraxacum apenninum Dahlst. ex H.Lindb.	DD		
Taraxacum erythrospermum Andr. ex Besser, 1821	DD		
Taraxacum linguatum M.P.Christ. & Wiinst., 1934	DD		
Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798	DD		
Thymus alpestris Tausch ex A.Kern., 1881	DD		
Utricularia intermedia Hayne, 1800	DD		
Utricularia ochroleuca R.W.Hartm., 1857	DD		
Utricularia stygia G.Thor, 1988	DD		

Taxons infra-spécifiques évalués indépendamment. Catégories RE, CR, EN VU, NT, DD

Nom scientifique	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Viola canina</i> L. subsp. <i>montana</i> (L.) Hartman	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>alpina</i> (Vill.) Greml, 1874	CR	D1	
<i>Viola canina</i> subsp. <i>schantzii</i> (Billot) Döll, 1862	CR	B(1+2)ab(ii,iii,iv,v) + D1	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> var. <i>silesiacum</i> (Milde) Milde, 1867	EN	D1	
<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv,v)	
<i>Festuca stricta</i> subsp. <i>sulcata</i> (Hack.) Patzke, 1961	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i> (L.) Poir., 1804	EN	D1	cultivé!
<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (H.Christ) Lovis & Reichst., 1980	VU	D2	
<i>Calamagrostis purpurea</i> subsp. <i>phragmitoides</i> (Hartm.) Tzvelev, 1965	VU	D2	
<i>Callitriche brutia</i> var. <i>hamulata</i> (Kütz. ex W.D.J.Koch) Lansdown, 2006	VU	D2	
<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>cambrensis</i> Fraser-Jenk., 1987	VU	D2	
<i>Festuca longifolia</i> subsp. <i>pseudocostei</i> Auquier & Kerguélen, 1978	VU	D2	
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt. subsp. <i>marginata</i>	VU	D2	
<i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>ovina</i>	VU	D2	
<i>Festuca pallens</i> subsp. <i>scabrifolia</i> (Hack. ex Rohlena) Zielonk., 1973	VU	D2	
<i>Montia fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> (Fenzl) Walters, 1953	VU	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>alba</i> Zamelis, 1926	VU	D2	
<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces., 1844	VU	D2	
<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	VU	D2	
<i>Vulpia myuros</i> subsp. <i>sciuroides</i> (Roth) Rouy	VU	D2	
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>hastatum</i> (H.Christ) S.Jess., 1995	NT	pr.D2	
<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>villosa</i> (Huds.) Celak., 1871	NT	pr.D2	
<i>Prunus padus</i> subsp. <i>borealis</i> Nyman, 1878	NT	pr.D2	
<i>Serratula tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>	NT	pr. D2	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> subsp. <i>nipponicum</i> (Honda) Tzvelev, 1967	DD		
<i>Festuca stricta</i> subsp. <i>trachyphylla</i> (Hack.) Patzke, 1961	DD		
<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Schübler & G.Martens, 1834	DD		
<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>fontana</i>	DD		
<i>Montia fontana</i> subsp. <i>amporitana</i> Sennen, 1911	DD		
<i>Ranunculus alsaticus</i> W.Koch, 1939	DD		
<i>Scabiosa columbaria</i> subsp. <i>pratensis</i> (Jord.) Braun-Blanq., 1933	DD		
<i>Serratula tinctoria</i> subsp. <i>monticola</i> (Boreau) Berher, 1887	DD		
<i>Setaria verticillata</i> var. <i>ambigua</i> (Guss.) Parl., 1845	DD		
<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>majus</i> (Crantz) Hook.f., 1870	DD		
<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás subsp. <i>polytrichus</i>	DD		
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>aquatica</i> Nyman, 1890	DD		

Hybrides des catégories RE, CR, EN VU, NT, DD

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Hieracium x fallax</i> Willd., 1809	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Equisetum x trachyodon</i> (A.Braun) W.D.J.Koch, 1845	VU	B2ab(ii,iv) (-1)	
<i>Hieracium x densiflorum</i> Tausch, 1828	VU	D2	
<i>Equisetum x alsaticum</i> (H.P.Fuchs & Geissert) G.Phil. ex M.Lubienski & H.W.Bennert, 2006	NT	pr.D2	
<i>Equisetum x ascendens</i> M. Lubienski et H.W. Bennert	NT	pr.D2	
<i>Asplenium x alternifolium</i> Wulfen, 1781	DD		
<i>Athyrium x reichsteinii</i> Schneller & Rasbach, 1984	DD		
<i>Cirsium x rigens</i> (Aiton) Wallr., 1822	DD		
<i>Crataegus x macrocarpa</i> Hegetschw., 1839	DD		
<i>Crataegus x media</i> Bechst., 1797	DD		
<i>Dryopteris x ambroseae</i> Fraser-Jenk. & Jermy, 1977	DD		
<i>Dryopteris x complexa</i> Fraser-Jenk., 1987	DD		
<i>Dryopteris x complexa</i> subsp. <i>complexa</i>	DD		
<i>Dryopteris x complexa</i> subsp. <i>critica</i> Fraser-Jenk., 1987	DD		
<i>Dryopteris x deweveri</i> (J.T.Jansen) J.T.Jansen & Wacht., 1934	DD		
<i>Equisetum x litorale</i> Kuhlew. ex Rupr., 1845	DD		
<i>Equisetum x meridionale</i> (Milde) Chiov., 1929	DD		
<i>Equisetum x moorei</i> Newman, 1854	DD		
<i>Hieracium x zizianum</i> Tausch, 1828	DD		
<i>Hypericum x desetangii</i> Lamotte, 1874	DD		
<i>Mentha x dumetorum</i> Schult., 1809	DD		
<i>Mentha x verticillata</i> L., 1759	DD		
<i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm. & U.Schneid., 1962	DD		
<i>Polystichum x bicknellii</i> (H.Christ) Hahne, 1905	DD		
<i>Potamogeton x fluitans</i> Roth, 1788	DD		
<i>Potamogeton x zizii</i> W.D.J.Koch ex Roth, 1827	DD		
<i>Potentilla x subarenaria</i> Zimmeter, 1884	DD		
<i>Rorippa x anceps</i> (Wahlenb.) Rchb., 1837	DD		
<i>Rosa dumalis</i> Bechst., 1810	DD		
<i>Rosa x dumetorum</i> Thuill., 1799	DD		

Liste par ordre alphabétique Espèces, taxons infrasécifiques évalués indépendamment et hybrides

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Abies alba</i> Mill., 1768	LC		
<i>Abies concolor</i> (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861	NA		
<i>Abies grandis</i> (Douglas ex D.Don) Lindl., 1833	NA		
<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach, 1841	NA		
<i>Abutilon theophrasti</i> Medik., 1787	NA		
<i>Acacia dealbata</i> Link, 1822	NA		
<i>Acanthus mollis</i> L., 1753	NA		
<i>Acer campestre</i> L., 1753	LC		
<i>Acer japonicum</i> Thunb., 1784	NA		
<i>Acer negundo</i> L., 1753	NA		
<i>Acer opalus</i> Mill., 1768	NA		
<i>Acer palmatum</i> Thunb., 1784	NA		
<i>Acer platanoides</i> L., 1753	LC		
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	LC		
<i>Acer saccharinum</i> L., 1753	NA		
<i>Achillea collina</i> Becker ex Rchb., 1832	DD		
<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit., 1802	NA		
<i>Achillea filipendulina</i> Lam., 1783	NA		
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	LC		
<i>Achillea nobilis</i> L., 1753	VU	C2a(i) + D2	
<i>Achillea pannonica</i> Scheele, 1844	DD		
<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	LC		
<i>Achillea setacea</i> Waldst. & Kit., 1802	DD		
<i>Aconitum lycoctonum</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Aconitum napellus</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>vulgare</i> Rouy & Foucaud, 1893	NA		
<i>Aconitum variegatum</i> L., 1753	NA		
<i>Acorus calamus</i> L., 1753	NA		
<i>Actaea spicata</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	NA		
<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern., 1871	LC		
<i>Adonis aestivalis</i> L., 1762	EN	B(1+2)b(i,ii,iii,iv)c(iii,iv) + C2ab	
<i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Adonis vernalis</i> L., 1753	VU	D(1+2)	mesures!
<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Aegopodium podagraria L., 1753	LC		
Aesculus hippocastanum L., 1753	NA		
Aesculus pavia L., 1753	NA		
Aethusa cynapium L., 1753	LC		
Ageratum houstonianum Mill., 1768	NA		
Agrimonia eupatoria L., 1753	LC		
Agrimonia procera Wallr., 1840	NT	pr.D2	
Agrostemma githago L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
Agrostis canina L., 1753	LC		
Agrostis capillaris L., 1753	LC		
Agrostis gigantea Roth, 1788	LC		
Agrostis mertensii Trin., 1836	NA		
Agrostis stolonifera L., 1753	LC		
Agrostis vinealis Schreb., 1771	LC		
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916	NA		
Aira caryophyllea L., 1753	LC		
Aira praecox L., 1753	NT	pr.D2	
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773	EN	B(1+2)b(iii)c(iii,iv)	
Ajuga genevensis L., 1753	LC		
Ajuga reptans L., 1753	LC		
Albizia julibrissin Durazz., 1772	NA		
Alcea rosea L., 1753	NA		
Alchemilla connivens Buser, 1894	DD		
Alchemilla coriacea Buser, 1891	DD		
Alchemilla demissa Buser, 1894	DD		
Alchemilla fallax Buser, 1894	LC		
Alchemilla flabellata Buser, 1891	VU	D2	
Alchemilla glabra Neygenf., 1821	LC		
Alchemilla glaucescens Wallr., 1840	DD		
Alchemilla hoppeana (Rchb.) Dalla Torre, 1882	EN	D1	
Alchemilla impexa Buser, 1894	DD		
Alchemilla lapeyrousii Buser, 1893	LC		
Alchemilla lineata Buser, 1894	DD		
Alchemilla micans Buser, 1893	DD		
Alchemilla mollis (Buser) Rothm., 1934	NA		
Alchemilla monticola Opiz, 1838	LC		
Alchemilla obtusa Buser, 1894	DD		
Alchemilla pallens Buser, 1892	EN	B(1+2)ab(iii)	
Alchemilla schmidelyana Buser, 1891	DD		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Alchemilla splendens</i> H.Christ ex Favrat, 1889	DD		
<i>Alchemilla strigosula</i> Buser, 1893	DD		
<i>Alchemilla vulgaris</i> L., 1753	LC		
<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm., 1937	LC		
<i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796	NT	pr.D2	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	LC		
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	LC		
<i>Allium ampeloprasum</i> L., 1753	NA		
<i>Allium angulosum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Allium carinatum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Allium coloratum</i> Spreng., 1825	DD		
<i>Allium lusitanicum</i> Lam., 1783	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Allium nigrum</i> L., 1762	VU	D2	
<i>Allium oleraceum</i> L., 1753	LC		
<i>Allium paradoxum</i> (M.Bieb.) G.Don, 1827	NA		
<i>Allium porrum</i> L., 1753	NA		
<i>Allium roseum</i> L., 1753	NA		
<i>Allium rotundum</i> L., 1762	EN	C2a(i)	
<i>Allium sativum</i> L., 1753	NA		
<i>Allium schoenoprasum</i> L., 1753	NA		
<i>Allium scorodoprasum</i> L., 1753	LC		
<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Allium suaveolens</i> Jacq., 1789	CR	B2ab(i,ii,iii,iv)	mesures!
<i>Allium ursinum</i> L., 1753	LC		
<i>Allium victorialis</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Allium vineale</i> L., 1753	LC		
<i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) K.Koch, 1872	NA		
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby, 1828	NA		
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	LC		
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794	LC		
<i>Alnus x badensis</i> Láng ex Regel, 1864	NA		
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799	NT	pr.D2	
<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	LC		
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762	LC		
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	LC		
<i>Alopecurus rendlei</i> Eig, 1937	VU	D2	
<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br. ex DC., 1813	NA		
<i>Althaea hirsuta</i> L., 1753	VU	C2b	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	NA		
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	NT	pr.B2b(i,ii,iii,iv)	
<i>Alyssum montanum</i> L., 1753	EN	B2ab(v) + D1	
<i>Amaranthus albus</i> L., 1759	NA		
<i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson, 1877	NA		
<i>Amaranthus blitum</i> L., 1753	LC		
<i>Amaranthus caudatus</i> L., 1753	NA		
<i>Amaranthus cruentus</i> L., 1759	NA		
<i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771	NA		
<i>Amaranthus graecizans</i> L., 1753	NA		
<i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753	LC		
<i>Amaranthus hybridus</i> subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974	NA		
<i>Amaranthus hybridus</i> var. <i>hybridus</i>	NA		
<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753	NA		
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	NA		
<i>Ambrosia psilostachya</i> DC., 1836	NA		
<i>Amelanchier lamarckii</i> F.G.Schroed., 1968	NA		
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	LC		
<i>Ammi majus</i> L., 1753	NA		
<i>Amorpha fruticosa</i> L., 1753	NA		
<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	CR	B2ab(i,ii,iv,v)+ D1	
<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	LC		
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	CR	D1	
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	LC		
<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth., 1873	NA		
<i>Anchusa italica</i> Retz., 1779	NA		
<i>Anchusa officinalis</i> L., 1753	NA		
<i>Anchusa undulata</i> L., 1753	NA		
<i>Andromeda polifolia</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii,iv,v)	
<i>Androsace halleri</i> L., 1753	CR	D1	mesures!
<i>Androsace maxima</i> L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Androsace septentrionalis</i> L., 1753	NA		
<i>Anemone apennina</i> L., 1753	NA		
<i>Anemone blanda</i> Schott & Kotschy, 1854	NA		
<i>Anemone hepatica</i> L., 1753	LC		
<i>Anemone narcissiflora</i> L., 1753	CR	B2ab(i,ii,iv,v) + D1	
<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	LC		
<i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753	LC		
<i>Anemone sylvestris</i> L., 1753	VU	D2+ B(1+2)ab(iii)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Anemone vitifolia Buch.-Ham. ex DC.	NA		
Anethum graveolens L., 1753	NA		
Angelica archangelica L., 1753	NA		
Angelica sylvestris L., 1753	LC		
Anoda cristata (L.) Schltldl., 1837	NA		
Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791	NT	pr.D2	
Anthemis arvensis L., 1753	LC		
Anthemis cotula L., 1753	EN	B2ab(i,ii,iv)	
Anthemis ruthenica M.Bieb., 1808	NA		
Anthericum liliago L., 1753	LC		
Anthericum ramosum L., 1753	NT	pr.C2a(i)	
Anthoxanthum aristatum Boiss., 1842	NA		
Anthoxanthum odoratum L., 1753	LC		
Anthoxanthum odoratum subsp. nipponicum (Honda) Tzvelev, 1967	DD		
Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808	NT	pr.D2	
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814	NA		
Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl., 1864	LC		
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814	LC		
Anthriscus sylvestris subsp. alpina (Vill.) Gremlj, 1874	CR	D1	
Anthyllis vulneraria L., 1753	LC		
Antirrhinum majus L., 1753	NA		
Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1812	NA		
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812	LC		
Aphanes arvensis L., 1753	LC		
Aphanes australis Rydb., 1908	VU	D2	
Apium graveolens L., 1753	NA		
Aquilegia atrata W.D.J.Koch, 1830	NT	pr.D2	
Aquilegia vulgaris L., 1753	LC		
Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée, 1960	LC		
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842	LC		
Arabis alpina L., 1753	VU	D(1+2)	
Arabis auriculata Lam., 1783	CR	B2ab(ii,iv)	
Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772	LC		
Arabis sagittata (Bertol.) DC., 1815	DD		
Arabis turrita L., 1753	VU	D2	
Arctium lappa L., 1753	LC		
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800	LC		
Arctium nemorosum Lej., 1833	DD		
Arctium tomentosum Mill., 1768	NT	pr.D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Arctium x nothum</i> (Ruhmer) J.Weiss, 1902	NA		
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	LC		
<i>Aristolochia clematitis</i> L., 1753	LC		
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	NA		
<i>Armeria vulgaris</i> Willd., 1809	NA		
<i>Armoracia rusticana</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	NA		
<i>Arnica montana</i> L., 1753	LC		
<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	LC		
<i>Artemisia absinthium</i> L., 1753	NA		
<i>Artemisia alba</i> Turra, 1764	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Artemisia annua</i> L., 1753	NA		
<i>Artemisia biennis</i> Willd., 1794	NA		
<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	LC		
<i>Artemisia dracunculus</i> L., 1753	NA		
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877	NA		
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	LC		
<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	NA		
<i>Arum maculatum</i> L., 1753	LC		
<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald, 1939	LC		
<i>Asarum europaeum</i> L., 1753	LC		
<i>Asclepias syriaca</i> L., 1753	NA		
<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753	NA		
<i>Asperugo procumbens</i> L., 1753	RE		
<i>Asperula arvensis</i> L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	LC		
<i>Asperula tinctoria</i> L., 1753	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	LC		
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> var. <i>silesiacum</i> (Milde) Milde, 1867	EN	D1	
<i>Asplenium ceterach</i> L., 1753	EN	D1	
<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh., 1799	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv,v)	
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753	LC		
<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	LC		
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795	LC		
<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	LC		
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>hastatum</i> (H.Christ) S.Jess., 1995	NT	pr.D2	
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (H.Christ) Lovis & Reichst., 1980	VU	D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Asplenium viride</i> Huds., 1762	NT	pr.D2	
<i>Asplenium x alternifolium</i> Wulfen, 1781	DD		
<i>Aster amellus</i> L., 1753	NT	pr.A2c	
<i>Astilbe japonica</i> (C.Morren & Decne.) A.Gray, 1841	NA		
<i>Astragalus cicer</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) + D2	
<i>Astragalus danicus</i> Retz., 1783	CR	D1	
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	LC		
<i>Astrantia major</i> L., 1753	NA		
<i>Athamanta cretensis</i> L., 1753	CR	D1	
<i>Athyrium distentifolium</i> Tausch ex Opiz, 1820	NT	pr.D2	
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	LC		
<i>Athyrium x reichsteinii</i> Schneller & Rasbach, 1984	DD		
<i>Atriplex hortensis</i> L., 1753	NA		
<i>Atriplex micrantha</i> Ledeb., 1829	LC		
<i>Atriplex patula</i> L., 1753	LC		
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805	NA		
<i>Atropa belladonna</i> L., 1753	LC		
<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC., 1821	NA		
<i>Aucuba japonica</i> Thunb. [1783]	NA		
<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv., 1815	NA		
<i>Avena sativa</i> L., 1753	NA		
<i>Avena sativa</i> subsp. <i>fatua</i> (L.) Thell.	LC		
<i>Avena strigosa</i> Schreb., 1771	NA		
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868	NT	pr.D2	
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	LC		
<i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783	NA		
<i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	NA		
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	NA		
<i>Ballota nigra</i> L., 1753	LC		
<i>Balsamita major</i> Desf., 1792	NA		
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau, 1840	VU	D2	
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch., 1864	NA		
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812	LC		
<i>Bartsia alpina</i> L., 1753	VU	D(1+2)	
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	LC		
<i>Berberis julianae</i> C.K.Schneid., 1913	NA		
<i>Berberis vulgaris</i> L., 1753	LC		
<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch, 1889	NA		
<i>Berteroa incana</i> (L.) DC., 1821	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	LC		
<i>Beta vulgaris</i> L., 1753	NA		
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	LC		
<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	LC		
<i>Bidens cernua</i> L., 1753	LC		
<i>Bidens connata</i> Muhlenb. ex Willd., 1803	NA		
<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	NA		
<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799	VU	D2	
<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	LC		
<i>Bidens x polakii</i> Velen., 1928	NA		
<i>Bifora radians</i> M.Bieb., 1819	NA		
<i>Biscutella laevigata</i> L., 1771	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Blackstonia acuminata</i> (W.D.J.Koch & Ziz) Domin, 1933	VU	D2	
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	VU	D2	
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	LC		
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link, 1827	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	VU	D2	
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Borago officinalis</i> L., 1753	NA		
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936	NA		
<i>Botrychium lanceolatum</i> (S.G.Gmel.) Ångstr., 1854	NA		
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw., 1802	NT	pr.D2	
<i>Botrychium matricariifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch, 1846	CR	D1 + C2a(i)	
<i>Botrychium multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr., 1859	RE		
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	LC		
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv., 1812	NA		
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	LC		
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern., 1859	NA		
<i>Brassica napus</i> L., 1753	NA		
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	LC		
<i>Brassica oleracea</i> L., 1753	NA		
<i>Brassica rapa</i> L., 1753	NA		
<i>Briza maxima</i> L., 1753	NA		
<i>Briza media</i> L., 1753	LC		
<i>Bromus arvensis</i> L., 1753	LC		
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen, 1872	LC		
<i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791	NA		
<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806	NA		
<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	LC		
<i>Bromus inermis</i> Leyss., 1761	LC		
<i>Bromus intermedius</i> Guss., 1827	NA		
<i>Bromus japonicus</i> Thunb., 1784	NA		
<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	LC		
<i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762	LC		
<i>Bromus rubens</i> L., 1755	NA		
<i>Bromus secalinus</i> L., 1753	LC		
<i>Bromus sitchensis</i> Trin., 1832	NA		
<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	LC		
<i>Bromus tectorum</i> L., 1753	LC		
<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I.M.Johnst.	NA		
<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968	LC		
<i>Buddleja alternifolia</i> Maxim., 1880	NA		
<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	NA		
<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	NT	pr.B2b(ii,iii,iv)c(iii)	
<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	NT	pr.D2	
<i>Bunias erucago</i> L., 1753	NA		
<i>Bunias orientalis</i> L., 1753	NA		
<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Buphthalmum salicifolium</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,iii) + D2	mesures!
<i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753	LC		
<i>Bupleurum longifolium</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii,iv)	
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng., 1813	NA		
<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	LC		
<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	EN	A4e	cultivé!
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth, 1788	LC		
<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789	NT	pr.D2	mesures!
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	LC		
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller f.) Koeler, 1802	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Calamagrostis purpurea</i> subsp. <i>phragmitoides</i> (Hartm.) Tzvelev, 1965	VU	D2	
<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.) Host, 1809	NA		
<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl., 1860	RE		
<i>Calendula arvensis</i> L., 1763	VU	D2 + B(1+2)ab(ii,iii,iv)	cultivé!
<i>Calendula officinalis</i> L., 1753	NA		
<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell., 1905	NA		
<i>Calla palustris</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Callitriche brutia</i> Petagna, 1787	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Callitriche brutia</i> var. <i>hamulata</i> (Kütz. ex W.D.J.Koch) Lansdown, 2006	VU	D2	
<i>Callitriche cophocarpa</i> Sendtn., 1854	NA		
<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852	LC		
<i>Callitriche palustris</i> L., 1753	DD		
<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz., 1842	DD		
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	LC		
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	LC		
<i>Caltha palustris</i> L., 1753	LC		
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	LC		
<i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC., 1821	VU	D2 + B2ab(iii)c(iv)	
<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz, 1762	NA		
<i>Campanula baumgartenii</i> Becker, 1827	VU	B(1+2)ab(ii,iv) + D2	
<i>Campanula cervicaria</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam., 1785	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	LC		
<i>Campanula latifolia</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Campanula patula</i> L., 1753	VU	C2a(i)	
<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	LC		
<i>Campanula portenschlagiana</i> Roem. & Schult., 1819	NA		
<i>Campanula poscharskyana</i> Degen, 1908	NA		
<i>Campanula rapunculoides</i> L., 1753	LC		
<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	LC		
<i>Campanula rhomboidalis</i> L., 1753	NA		
<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	LC		
<i>Campanula trachelium</i> L., 1753	LC		
<i>Campsis radicans</i> (L.) Seemen, 1867	NA		
<i>Cannabis sativa</i> L., 1753	NA		
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	LC		
<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>gracilis</i> (Gren.) Hobk., 1869	NA		
<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>rubella</i> (Reut.) Hobk., 1869	NA		
<i>Capsicum annum</i> L., 1753	NA		
<i>Caragana arborescens</i> Lam., 1785	NA		
<i>Cardamine amara</i> L., 1753	LC		
<i>Cardamine dentata</i> Schult., 1809	VU	D2	
<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	LC		
<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903	LC		
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	LC		
<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	LC		
<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz, 1769	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	LC		
<i>Carduus acanthoides</i> L., 1753	NA		
<i>Carduus crispus</i> L., 1753	LC		
<i>Carduus defloratus</i> L., 1759	VU	D2	
<i>Carduus nutans</i> L., 1753	LC		
<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq., 1776	NT	pr.D2	
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793	NA		
<i>Carex acuta</i> L., 1753	LC		
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	LC		
<i>Carex alba</i> Scop., 1772	LC		
<i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Carex bohémica</i> Schreb., 1772	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)(-1)	cultivé!
<i>Carex brachystachys</i> Schrank, 1789	NA		
<i>Carex brizoides</i> L., 1755	LC		
<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb., 1803	VU	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	mesures!
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	LC		
<i>Carex crawfordii</i> Fernald, 1902	NA		
<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	LC		
<i>Carex curta</i> Gooden., 1794	NT	pr.D2	
<i>Carex davalliana</i> Sm., 1800	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With., 1787	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Carex diandra</i> Schrank, 1781	EN	B2ab(i)	
<i>Carex digitata</i> L., 1753	LC		
<i>Carex dioica</i> L., 1753	RE		
<i>Carex distans</i> L., 1759	VU	B(1+2)ab(iii) + D2	
<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	LC		
<i>Carex divisa</i> Huds., 1762	NA		
<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	LC		
<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	LC		
<i>Carex elata</i> All., 1785	LC		
<i>Carex elongata</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	LC		
<i>Carex flava</i> L., 1753	LC		
<i>Carex frigida</i> All., 1785	VU	D2	
<i>Carex fritschii</i> Waisb., 1895	EN	B(1+2)ab(iii,v)	
<i>Carex hartmanii</i> Cajander, 1935	VU	D2	
<i>Carex hirta</i> L., 1753	LC		
<i>Carex hordeistichos</i> Vill., 1779	VU	D2	
<i>Carex hostiana</i> DC., 1813	VU	D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Carex humilis Leyss., 1758	VU	D2	
Carex lasiocarpa Ehrh., 1784	EN	B2ab(i,ii,iv)	
Carex limosa L., 1753	VU	D2	
Carex montana L., 1753	LC		
Carex nigra (L.) Reichard, 1778	LC		
Carex ornithopoda Willd., 1805	LC		
Carex ovalis Gooden., 1794	LC		
Carex pairae F.W.Schultz, 1868	LC		
Carex pallescens L., 1753	LC		
Carex panicea L., 1753	LC		
Carex paniculata L., 1755	LC		
Carex pauciflora Lightf., 1777	VU	D2	mesures!
Carex pendula Huds., 1762	LC		
Carex pilosa Scop., 1772	NT	pr.D2	
Carex pilulifera L., 1753	LC		
Carex praecox Schreb., 1771	VU	D2	
Carex pseudocyperus L., 1753	NT	pr.D2	
Carex pulicaris L., 1753	VU	D2	répartition!
Carex remota L., 1755	LC		
Carex riparia Curtis, 1783	LC		
Carex rostrata Stokes, 1787	LC		
Carex spicata Huds., 1762	LC		
Carex strigosa Huds., 1778	LC		
Carex sylvatica Huds., 1762	LC		
Carex tomentosa L., 1767	LC		
Carex umbrosa Host, 1801	LC		
Carex vesicaria L., 1753	LC		
Carex viridula Michx., 1803	LC		
Carex viridula subsp. oedocarpa (Andersson) B.Schmid, 1983	LC		
Carex viridula var. elatior (Schltdl.) Crins, 1989	LC		
Carex vulpina L., 1753	LC		
Carex x fulva Gooden., 1794	NA		
Carlina acaulis L., 1753	VU	D2	
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem., 1819	VU	D(1+2)	
Carlina vulgaris L., 1753	LC		
Carpesium cernuum L., 1753	RE		
Carpinus betulus L., 1753	LC		
Carthamus tinctorius L., 1753	NA		
Carum carvi L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	EN	D1	
<i>Carya alba</i> (L.) Nutt., 1818	NA		
<i>Carya amara</i> Nutt., 1818	NA		
<i>Carya ovata</i> (Mill.) K.Koch, 1869	NA		
<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	NA		
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv., 1812	VU	B(1+2)ab(i,iii) + D2	
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter, 1788	NA		
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	NT	pr.D2	
<i>Caucalis platycarpos</i> L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855	NA		
<i>Cedrus libani</i> A.Rich., 1823	NA		
<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	NA		
<i>Celosia cristata</i> L., 1753	NA		
<i>Celtis occidentalis</i> L., 1753	NA		
<i>Centaurea alpestris</i> Hegetschw., 1839	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Centaurea bracteata</i> Scop., 1786	NA		
<i>Centaurea calcitrapa</i> L., 1753	NA		
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	LC		
<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>grinensis</i> (Reut.) Nyman	NA		
<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753	LC		
<i>Centaurea stoebe</i> L., 1753	LC		
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800	LC		
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	LC		
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805	NA		
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	LC		
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	LC		
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	LC		
<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Schrad. ex Roem. & Schult., 1818	NA		
<i>Cerastium arvense</i> L., 1753	LC		
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805	LC		
<i>Cerastium dubium</i> (Bastard) Guépin, 1838	DD		
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	LC		
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	LC		
<i>Cerastium glutinosum</i> Fr., 1817	LC		
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	LC		
<i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753	LC		
<i>Cerastium tomentosum</i> L., 1753	NA		
<i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753	LC		
<i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763	VU	D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Ceratostigma plumbaginoides</i> Bunge, 1833	NA		
<i>Ceratostigma willmottianum</i> Stapf, 1914	NA		
<i>Cercis siliquastrum</i> L., 1753	NA		
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788	LC		
<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834	NA		
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange, 1870	LC		
<i>Chaerophyllum aureum</i> L., 1762	NA		
<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L., 1753	LC		
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L., 1753	LC		
<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	LC		
<i>Chaerophyllum villarsii</i> W.D.J.Koch, 1837	NA		
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A.Murray) Parl., 1866	NA		
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	NA		
<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	LC		
<i>Chenopodium album</i> L., 1753	LC		
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L., 1753	LC		répartition!
<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm., 1800	VU	B(1+2)ab(i,ii,iv)(-1)	
<i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Chenopodium hybridum</i> L., 1753	LC		
<i>Chenopodium leptophyllum</i> (Nutt. ex Moq.) S.Watson, 1874	NA		
<i>Chenopodium murale</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv)c(iii,iv)(-1)	
<i>Chenopodium polyspermum</i> L., 1753	LC		
<i>Chenopodium rubrum</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Chenopodium strictum</i> Roth, 1821	NA		
<i>Chenopodium urbicum</i> L., 1753	NA		
<i>Chenopodium vulvaria</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)c(ii,iii)	
<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W.P.C.Barton, 1817	RE		
<i>Chondrilla juncea</i> L., 1753	LC		
<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin., 1820	NA		
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753	LC		
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	LC		
<i>Cichorium endivia</i> L., 1753	NA		
<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	LC		
<i>Cicuta virosa</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Circaea alpina</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	LC		
<i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769	LC		
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772	NT	pr.D2	
<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill, 1768	NA		
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop., 1769	LC		
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	LC		
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785	LC		
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	LC		
<i>Cirsium x hybridum</i> Koch ex DC., 1815	NA		
<i>Cirsium x rigens</i> (Aiton) Wallr., 1822	DD		
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	VU	B2ab(iii) + D2	mesures!
<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd., 1798	NA		
<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill., 1768	NA		
<i>Clematis recta</i> L., 1753	NA		
<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	LC		
<i>Clerodendron trichotomum</i> Thunb.	NA		
<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, 1891	LC		
<i>Clinopodium ascendens</i> (Jord.) Samp., 1913	DD		
<i>Clinopodium menthifolium</i> (Host) Stace, 1989	LC		
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	NA		
<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	LC		
<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet, 1983	EN	B2ab(ii,iii,iv,v)	
<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	LC		
<i>Colchicum multiflorum</i> Brot., 1804	NA		
<i>Collomia grandiflora</i> Douglas ex Lindl., 1828	NA		
<i>Colutea arborescens</i> L., 1753	VU	D2	mesures! / cultivé!
<i>Colutea orientalis</i> Mill., 1768	NA		
<i>Commelina communis</i> L., 1753	NA		
<i>Conium maculatum</i> L., 1753	LC		
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	NA		
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort., 1827	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur, 1853	NA		
<i>Consolida regalis</i> Gray, 1821	EN	B2b(ii,iii,iv)c(iv)	
<i>Convallaria majalis</i> L., 1753	LC		
<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	LC		
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel., 1760	EN	D1	
<i>Coreopsis lanceolata</i> L., 1753	NA		
<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt., 1821	NA		
<i>Coriandrum sativum</i> L., 1753	NA		
<i>Coriaria myrtifolia</i> L., 1753	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Cornus alba L.	NA		
Cornus mas L., 1753	LC		
Cornus sanguinea L., 1753	LC		
Coronilla vaginalis Lam., 1786	CR	D1	
Corrigiola litoralis L., 1753	EN	B2ab(ii,iv)	
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte, 1811	LC		
Corydalis intermedia (L.) Mérat, 1812	EN	B(1+2)ab(iii)	
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811	LC		
Corylus avellana L., 1753	LC		
Corylus colurna L., 1753	NA		
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812	VU	D2	
Cosmos bipinnatus Cav., 1791	NA		
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844	VU	D2	cultivé!
Cotinus coggygria Scop., 1771	NA		
Cotoneaster dammeri C.K.Schneid., 1906	NA		
Cotoneaster franchetii Bois, 1902	NA		
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879	NA		
Cotoneaster integerrimus Medik., 1793	LC		
Cotoneaster juranus Gand., 1875	DD		
Cotoneaster salicifolius Franch., 1885	NA		
Cotoneaster simonsii Baker, 1869	NA		
Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822	EN	D1 (-1)	
Cotoneaster x intermedius (Lecoq & Lamotte) H.J.Coste, 1923	NA		
Crataegus azarolus L., 1753	NA		
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825	LC		
Crataegus monogyna Jacq., 1775	LC		
Crataegus rhipidophylla Gand., 1872	NA		
Crataegus x macrocarpa Hegetschw., 1839	DD		
Crataegus x media Bechst., 1797	DD		
Crepis biennis L., 1753	LC		
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840	LC		
Crepis foetida L., 1753	NT	pr.A2c + pr.B2b(i)	
Crepis nicaeensis Balb., 1807	NA		
Crepis paludosa (L.) Moench, 1794	LC		
Crepis praemorsa (L.) Walther, 1802	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	
Crepis pulchra L., 1753	NT	pr.D2	
Crepis pyrenaica (L.) Greuter, 1970	VU	D2	
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913	LC		
Crepis setosa Haller f., 1797	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Crepis tectorum</i> L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Crepis vesicaria</i> L., 1753	LC		
<i>Crocus albiflorus</i> Kit., 1814	VU	D2	
<i>Crocus vernus</i> (L.) Hill, 1765	DD		
<i>Crocus versicolor</i> Ker Gawl., 1808	NA		
<i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend., 1958	NA		
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	LC		
<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R.Br., 1842	NT	pr.D2	
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne, 1786	NA		
<i>Cucurbita pepo</i> L., 1753	NA		
<i>Cupressus arizonica</i> Greene, 1882	NA		
<i>Cupressus sempervirens</i> L., 1753	NA		
<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe, 1824	RE		
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774	LC		
<i>Cuscuta europaea</i> L., 1753	LC		
<i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill, 1768	LC		
<i>Cyanus segetum</i> Hill, 1762	LC		
<i>Cydonia oblonga</i> Mill., 1768	NA		
<i>Cymbalaria muralis</i> P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	LC		
<i>Cynara scolymus</i> L., 1753	NA		
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	NA		
<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq., 1767	LC		
<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	LC		
<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	LC		
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	NA		
<i>Cyperus esculentus</i> L., 1753	NA		
<i>Cyperus flavescens</i> L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	LC		
<i>Cyperus longus</i> L., 1753	NA		
<i>Cypripedium calceolus</i> L., 1753	RE		
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	LC		
<i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet, 1826	NA		
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	LC		
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	LC		
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>lobata</i> (Drejer) H.Lindb., 1906	LC		
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	DD		
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	LC		
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó, 1962	EN	C2a(i)	
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut.) Soó, 1962	DD		
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	EN	C2a(i)	
<i>Dactylorhiza x aschersoniana</i> (Hauskn.) Borsos & Soó, 1960	NA		
<i>Dahlia pinnata</i> Cav., 1791	NA		
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	LC		
<i>Daphne cneorum</i> L., 1753	RE		
<i>Daphne laureola</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	LC		
<i>Datura stramonium</i> L., 1753	LC		
<i>Daucus carota</i> L., 1753	LC		
<i>Delphinium montanum</i> DC., 1815	NA		
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	LC		
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	LC		
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl, 1891	VU	B(1+2)b(ii,iii,iv)c(iv)(-1)	
<i>Dianthus armeria</i> L., 1753	LC		
<i>Dianthus barbatus</i> L., 1753	NA		
<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	LC		
<i>Dianthus caryophyllus</i> L., 1753	NA		
<i>Dianthus deltoides</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill., 1789	RE		
<i>Dianthus plumarius</i> L., 1753	NA		
<i>Dianthus superbus</i> L., 1755	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Dictamnus albus</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill., 1768	NT	pr.D2	
<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	LC		
<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	LC		
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Schreb. ex Mühl., 1817	LC		
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771	NA		
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	LC		
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub, 1975	VU	D2	
<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub, 1975	RE		
<i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub, 1975	VU	D2	
<i>Diphasiastrum oelgaardii</i> Stoor, Boudrie, Jérôme, K.Horn & Bennert, 1996	VU	D2	
<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub, 1975	EN	A2ac	
<i>Diphasiastrum zeilleri</i> (Rouy) Holub, 1975	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv,v)	
<i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC., 1821	NA		
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC., 1821	VU	D2	
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Dipsacus fullonum L., 1753	LC		
Dipsacus laciniatus L., 1753	LC		
Dipsacus pilosus L., 1753	LC		
Dipsacus sativus (L.) Honck., 1782	NA		
Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973	NA		
Doronicum pardalianches L., 1753	VU	pr.D2	cultivé!
Draba aizoides L., 1767	EN	B2ab(iii)	
Draba muralis L., 1753	EN	C2b	
Drosera intermedia Hayne, 1798	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Drosera rotundifolia L., 1753	NT	pr.D2	
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	LC		
Dryopteris affinis subsp. cambrensis Fraser-Jenk., 1987	VU	D2	
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	LC		
Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848	CR	B(1+2)ab(i,ii,iv) + D1	
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848	LC		
Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy, 1977	DD		
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834	LC		
Dryopteris remota (A.Braun ex Döll) Druce, 1908	LC		
Dryopteris x ambroseae Fraser-Jenk. & Jermy, 1977	DD		
Dryopteris x complexa Fraser-Jenk., 1987	DD		
Dryopteris x complexa subsp. complexa	DD		
Dryopteris x complexa subsp. critica Fraser-Jenk., 1987	DD		
Dryopteris x deweveri (J.T.Jansen) J.T.Jansen & Wacht., 1934	DD		
Duchesnea indica (Andrews) Focke, 1888	NA		
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002	NA		
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants, 2002	NA		
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants, 2002	NA		
Echinochloa colona (L.) Link, 1833	NA		
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812	NA		
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A.Gray, 1840	NA		
Echinops sphaerocephalus L., 1753	LC		
Echium vulgare L., 1753	LC		
Elaeagnus angustifolia L., 1753	NA		
Elatine alsinastrum L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808	EN	B(1+2)ab(i,iii)c(iv)(-1)	
Elatine hydropiper L., 1753	CR	B2ab(ii,iv)	
Elatine triandra Schkuhr, 1791	EN	B(1+2)b(i,iii)c(iv)(-1)	
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817	NT	pr.D2	
Eleocharis mamillata H.Lindb., 1902	NT	pr.D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	NA		
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	LC		
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz, 1949	RE		
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	LC		
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788	NA		
<i>Elodea callitrichoides</i> (Rich.) Casp., 1857	NA		
<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	NA		
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John, 1920	NA		
<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986	DD		
<i>Elytrigia elongata</i> (Host) Nevski, 1936	NA		
<i>Elytrigia intermedia</i> (Host) Nevski, 1933	DD		
<i>Elytrigia obtusiflora</i> (DC.) Tzvelev, 1993	NA		
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	LC		
<i>Empetrum nigrum</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,iii) + D2	
<i>Epikeros pyrenaicus</i> (L.) Raf., 1840	LC		
<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.) Krock., 1787	NT	pr.D2	
<i>Epilobium anagallidifolium</i> Lam., 1786	NA		
<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	LC		
<i>Epilobium brachycarpum</i> C.Presl, 1831	NA		
<i>Epilobium ciliatum</i> Raf., 1808	NA		
<i>Epilobium collinum</i> C.C.Gmel., 1826	LC		
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill., 1779	LC		
<i>Epilobium duriaei</i> J.Gay ex Godr., 1849	DD		
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	LC		
<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri, 1818	NT	pr.D2	
<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	LC		
<i>Epilobium nutans</i> F.W.Schmidt, 1794	VU	D2	
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771	LC		
<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	LC		
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	LC		
<i>Epilobium roseum</i> Schreb., 1771	LC		
<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	LC		
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	LC		
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	LC		
<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery, 1921	LC		
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800	EN	D1	
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921	EN	B2b(iii)c(iv)	
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	VU	B(1+2)b(ii,iii)c(iv)(-1)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Epipactis viridiflora</i> (Hoffm.) Krock., 1814	LC		
<i>Epipogium aphyllum</i> Sw., 1814	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv) + D1	
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	LC		
<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	LC		
<i>Equisetum hyemale</i> L., 1753	LC		
<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	LC		
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799	VU	D2	
<i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753	LC		
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	LC		
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich., 1797	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Equisetum x alsaticum</i> (H.P.Fuchs & Geissert) G.Phil. ex M.Lubienski & H.W.Bennert, 2006	NT	pr.D2	
<i>Equisetum x ascendens</i> M. Lubienski et H.W. Bennert	NT	pr.D2	
<i>Equisetum x litorale</i> Kuhlew. ex Rupr., 1845	DD		
<i>Equisetum x meridionale</i> (Milde) Chiov., 1929	DD		
<i>Equisetum x moorei</i> Newman, 1854	DD		
<i>Equisetum x trachyodon</i> (A.Braun) W.D.J.Koch, 1845	VU	B2ab(ii,iv) (-1)	
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vignolo ex Janch., 1907	NA		
<i>Eragrostis minor</i> Host, 1809	NA		
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	NA		
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb., 1807	NA		
<i>Erica herbacea</i> L., 1753	NA		
<i>Erica tetralix</i> L., 1753	NA		
<i>Erica vagans</i> L., 1770	NA		
<i>Erigeron acris</i> L., 1753	LC		
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	LC		
<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>septentrionalis</i> (Fernald & Wiegand) Wagenitz, 1965	NA		
<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>strigosus</i> (Mühl. ex Willd.) Wagenitz, 1965	NA		
<i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753	NA		
<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	NA		
<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810	NA		
<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., 1821	NA		
<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	LC		
<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth, 1806	CR	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	VU	D2	
<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	LC		
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér., 1789	NA		
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Erophila verna</i> subsp. <i>praecox</i> (Steven) Em.Schmid, 1919	NA		
<i>Eruca sativa</i> Mill., 1768	NA		
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E.Schulz, 1916	LC		
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O.E.Schulz, 1916	NT	pr.D2	
<i>Eryngium bourgatii</i> Gouan, 1773	NA		
<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	LC		
<i>Eryngium giganteum</i> M.Bieb., 1808	NA		
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L., 1753	LC		
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz, 1769	NA		
<i>Erysimum ochroleucum</i> (Schleich.) DC., 1805	NA		
<i>Erysimum virgatum</i> Roth, 1797	NA		
<i>Eschscholzia californica</i> Cham., 1820	NA		
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	LC		
<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill., 1768	NA		
<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	LC		
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	LC		
<i>Euphorbia chamaesyce</i> L., 1753	NA		
<i>Euphorbia characias</i> L., 1753	NA		
<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	LC		
<i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753	LC		
<i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman, 1890	NA		
<i>Euphorbia esula</i> L., 1753	DD		
<i>Euphorbia exigua</i> L., 1753	LC		
<i>Euphorbia falcata</i> L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC., 1813	LC		
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	LC		
<i>Euphorbia humifusa</i> Willd. ex Schldtl., 1813	NA		
<i>Euphorbia hyberna</i> L., 1753	NA		
<i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753	NA		
<i>Euphorbia maculata</i> L., 1753	NA		
<i>Euphorbia nutans</i> Lag., 1816	NA		
<i>Euphorbia palustris</i> L., 1753	NT	pr.B(1+2)b(iii)	
<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753	LC		
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L., 1753	LC		
<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	NT	pr.D2	
<i>Euphorbia serpens</i> Kunth, 1817	NA		
<i>Euphorbia stricta</i> L., 1759	LC		
<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb., 1831	NA		
<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr., 1815	NT	pr.D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Euphrasia officinalis</i> L., 1753	LC		
<i>Euphrasia picta</i> Wimm., 1857	VU	D2	
<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck, 1794	EN	B2ab(iv,v)	
<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	LC		
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench, 1794	NA		
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	LC		
<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh., 1800	LC		
<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub, 1971	NA		
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	LC		
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub, 1971	NA		
<i>Festuca airoides</i> Lam., 1788	VU	D2	
<i>Festuca altissima</i> All., 1789	LC		
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	LC		
<i>Festuca duvalii</i> (St.-Yves) Stöhr, 1955	NT	pr.D2	
<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	VU	D2	
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787	LC		
<i>Festuca glauca</i> Vill., 1787	NA		
<i>Festuca heteropachys</i> (St.-Yves) Patzke ex Auquier, 1973	LC		
<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779	LC		
<i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809	LC		
<i>Festuca longifolia</i> subsp. <i>pseudocostei</i> Auquier & Kerguélen, 1978	VU	D2	
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt. subsp. <i>marginata</i>	VU	D2	
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt., 1890	VU	D2	
<i>Festuca marginata</i> subsp. <i>gallica</i> (Hack. ex Charrel) Breistr., 1966	NA		
<i>Festuca nigrescens</i> Lam., 1788	NA		
<i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>ovina</i>	VU	D2	
<i>Festuca ovina</i> L., 1753	LC		
<i>Festuca pallens</i> Host subsp. <i>pallens</i>	NA		
<i>Festuca pallens</i> Host, 1802	NA		
<i>Festuca pallens</i> subsp. <i>scabrifolia</i> (Hack. ex Rohlena) Zielonk., 1973	VU	D2	
<i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762	LC		
<i>Festuca rubra</i> L., 1753	LC		
<i>Festuca stricta</i> Host, 1802	NA		
<i>Festuca stricta</i> subsp. <i>sulcata</i> (Hack.) Patzke, 1961	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Festuca stricta</i> subsp. <i>trachyphylla</i> (Hack.) Patzke, 1961	DD		
<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin, 1811	EN	B(1+2)ab(i,iii,v)	
<i>Ficus carica</i> L., 1753	NA		
<i>Filago arvensis</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,iii) + D2	
<i>Filago gallica</i> L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Filago lutescens</i> Jord., 1846	VU	D2	
<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers., 1807	LC		
<i>Filago neglecta</i> (Soy.-Will.) DC., 1838	RE		
<i>Filago pyramidata</i> L., 1753	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779	LC		
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	LC		
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	LC		
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	NA		
<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl, 1804	NA		
<i>Forsythia viridissima</i> Lindl., 1846	NA		
<i>Forsythia x intermedia</i> Zabel, 1885	NA		
<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet, 1984	VU	D2	
<i>Fragaria moschata</i> Weston, 1771	NT	pr.D2	
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	LC		
<i>Fragaria viridis</i> Weston, 1771	LC		
<i>Fragaria x ananassa</i> (Weston) Duchesne, 1788	NA		
<i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766	LC		
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	NA		
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	LC		
<i>Fraxinus ornus</i> L., 1753	NA		
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall, 1785	NA		
<i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753	NA		
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	NA		
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	VU	B(1+2)ab(iii) + D2	
<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753	LC		
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809	VU	B(1+2)ab(i,iii)	
<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829	NA		
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809	NT	pr.A3e	
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1827	EN	C2a(i)	
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	NT	pr.B2b(iii)	
<i>Gaillardia pulchella</i> Foug., 1786	NA		
<i>Gaillardia x grandiflora</i> Van Houtte, 1857	NA		
<i>Galanthus nivalis</i> L., 1753	LC		
<i>Galatella linoisyris</i> (L.) Rchb.f., 1854	EN	B2b(iii)c(iv)	
<i>Galega officinalis</i> L., 1753	NA		
<i>Galeopsis ladanum</i> L., 1753	LC		
<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Schübler & G.Martens, 1834	DD		
<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>villosa</i> (Huds.) Celak., 1871	NT	pr.D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Galeopsis tetrahit L., 1753	LC		
Galeopsis x ochrerythra Prael, 1890	NA		
Galinsoga parviflora Cav., 1795	NA		
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798	NA		
Galium anisophyllum Vill., 1779	NA		
Galium aparine L., 1753	LC		
Galium boreale L., 1753	LC		
Galium glaucum L., 1753	VU	D2	
Galium lucidum All., 1773	NA		
Galium mollugo L., 1753	LC		
Galium odoratum (L.) Scop., 1771	LC		
Galium palustre L., 1753	LC		
Galium parisiense L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
Galium pumilum Murray, 1770	LC		
Galium rotundifolium L., 1753	LC		
Galium saxatile L., 1753	LC		
Galium sylvaticum L., 1762	LC		
Galium tricorutum Dandy, 1957	EN	B2ab(ii,iv)	
Galium uliginosum L., 1753	LC		
Galium verum L., 1753	LC		
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812	NA		
Gaura lindheimeri Engelm. & A.Gray, 1845	NA		
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805	NA		
Genista germanica L., 1753	LC		
Genista pilosa L., 1753	LC		
Genista sagittalis L., 1753	LC		
Genista tinctoria L., 1753	LC		
Gentiana acaulis L., 1753	NA		
Gentiana burseri subsp. villarsii (Griseb.) Rouy, 1908	NA		
Gentiana cruciata L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) + D2	
Gentiana lutea L., 1753	LC		
Gentiana pannonica Scop., 1771	NA		
Gentiana pneumonanthe L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii,v)	mesures!
Gentiana utriculosa L., 1753	RE		
Gentiana verna L., 1753	EN	D1	mesures!
Gentianella campestris (L.) Börner, 1912	VU	B(1+2)ab(ii,v)	
Gentianella ciliata (L.) Borkh., 1796	EN	B2ab(iii)*	mesures!
Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv,v)	
Geranium columbinum L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	LC		
<i>Geranium lucidum</i> L., 1753	EN	D1	
<i>Geranium macrorrhizum</i> L., 1753	NA		
<i>Geranium molle</i> L., 1753	LC		
<i>Geranium palustre</i> L., 1756	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Geranium pratense</i> L., 1753	LC		
<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	LC		
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759	LC		
<i>Geranium rivulare</i> Vill., 1779	NA		
<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	LC		
<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman, 1878	NA		
<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	LC		
<i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	LC		
<i>Geranium sylvaticum</i> L., 1753	LC		
<i>Geum hispidum</i> Fr., 1817	NA		
<i>Geum pyrenaicum</i> Mill., 1768	NA		
<i>Geum rivale</i> L., 1753	LC		
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	LC		
<i>Ginkgo biloba</i> L., 1771	NA		
<i>Gladiolus communis</i> L., 1753	NA		
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin, 1828	CR	B(1+2)ab(iii,v)	
<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach, 1841	NA		
<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr., 1869	EN	B2ab(i,iii)	
<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	LC		
<i>Globularia bisnagarica</i> L., 1753	EN	B2ab(iii)*	
<i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859	DD		
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	LC		
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919	LC		
<i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827	LC		
<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc., 1928	NA		
<i>Glycine max</i> (L.) Merr., 1917	NA		
<i>Gnaphalium norvegicum</i> Gunnerus, 1772	LC		
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L., 1753	LC		
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	LC		
<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br., 1813	LC		
<i>Gratiola neglecta</i> Torr., 1819	NA		
<i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii,v)	mesures!
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	NA		
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A.Dietr., 1839	DD		
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	CR	B(1+2)ab(i,ii,iv) + D1	
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman, 1851	LC		
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851	EN	D1	
<i>Gypsophila muralis</i> L., 1753	LC		
<i>Hamamelis mollis</i> Oliv.	NA		
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze, 1891	RE		
<i>Hedera helix</i> L., 1753	LC		
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	NA		
<i>Helianthemum grandiflorum</i> (Scop.) DC., 1805	LC		
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	LC		
<i>Helianthus annuus</i> L., 1753	NA		
<i>Helianthus tuberosus</i> L., 1753	NA		
<i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers., 1807	NA		
<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench, 1794	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Helichrysum foetidum</i> (L.) Moench, 1794	NA		
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	NA		
<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	EN	B(1+2)b(i,iii)c(iv)	
<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	LC		
<i>Helleborus niger</i> L., 1753	NA		
<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	NA		
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	LC		
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	VU	D2	
<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L., 1762	NA		
<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L., 1753	NA		
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895	NA		
<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	LC		
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br., 1813	CR	B2ab(i,ii,iv)c(iv)	
<i>Herniaria glabra</i> L., 1753	LC		
<i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753	VU	D2 + B(1+2)ab(iii)	
<i>Hesperis matronalis</i> L., 1753	NA		
<i>Heuchera sanguinea</i> Engelm.	NA		
<i>Hibiscus syriacus</i> L., 1753	NA		
<i>Hibiscus trionum</i> L., 1753	NA		
<i>Hieracium alpinum</i> L., 1753	CR	B(1+2)ab(iii,v) + D1	
<i>Hieracium arrectarium</i> Jord. ex Boreau, 1857	NA		
<i>Hieracium aurantiacum</i> L., 1753	NT	pr.D2	cultivé!
<i>Hieracium auriculoides</i> Láng, 1824	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Hieracium bauhinii Schult., 1809	VU	D2 + B(1+2)ab(iii)	
Hieracium bifidum Kit., 1815	DD		
Hieracium bifurcum M. Bieb.	NA		
Hieracium brachiatum Bertol. ex DC., 1815	NA		
Hieracium caespitosum Dumort., 1827	NT	pr.D2	
Hieracium calodon (Tausch) Nägeli & Peter, 1885	DD		
Hieracium comatulum Jord. ex Boreau, 1857	DD		
Hieracium crocatum Fr., 1846	DD		
Hieracium cyaneum Arv.-Touv., 1888	DD		
Hieracium diaphanoides Lindeb., 1882	DD		
Hieracium divisum Jord., 1848	NA		
Hieracium dubium L.	NA		
Hieracium fallaciforme Litv. et Zahn	NA		
Hieracium fallacinum F.W.Schultz, 1844	DD		
Hieracium flagelliferum Ravaud, 1877	NA		
Hieracium glaucinum Jord., 1848	LC		
Hieracium gothicum Fr., 1848	DD		
Hieracium humile Jacq., 1777	EN	B(1+2)ab(iii)	
Hieracium intybaceum All., 1773	VU	D2	
Hieracium inuloides Tausch, 1837	VU	D2	
Hieracium lachenalii C.C.Gmel., 1808	LC		
Hieracium lactucella Wallr., 1822	LC		
Hieracium laevigatum Willd., 1803	LC		
Hieracium lanceolatum Vill., 1788	DD		
Hieracium latifolium Froël. ex Link, 1822	DD		
Hieracium laurinum Arv.-Touv., 1879	DD		
Hieracium leontodontoides Arv.-Touv. & Briq., 1894	NA		
Hieracium lycopifolium Froël., 1838	DD		
Hieracium maculatum Schrank, 1789	LC		
Hieracium murorum L., 1753	LC		
Hieracium obscurum Rchb., 1823	NA		
Hieracium onosmoides Fr., 1848	NA		
Hieracium pallidum Biv., 1838	DD		
Hieracium peleterianum Mérat, 1812	VU	D2 + B2ab(ii,iii,iv)	
Hieracium piliferum Hoppe, 1799	NA		
Hieracium pilosella L., 1753	LC		
Hieracium piloselloides Vill., 1779	LC		
Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat, 1808	DD		
Hieracium praecox Sch.Bip., 1851	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Hieracium praecox</i> subsp. <i>bounophilum</i> (Jord. ex Boreau) Zahn, 1921	NA		
<i>Hieracium praecox</i> subsp. <i>pallidulum</i> (Jord. ex Boreau) Zahn, 1921	NA		
<i>Hieracium prasinifolium</i> Jord. ex Boreau, 1857	NA		
<i>Hieracium prenanthoides</i> Vill., 1779	EN	B(1+2)ab(ii,iv,v)	
<i>Hieracium racemosum</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1803	VU	D2	
<i>Hieracium rigidum</i> Hartm., 1820	NA		
<i>Hieracium rothianum</i> Wallr.	NA		
<i>Hieracium sabaudum</i> L., 1753	LC		
<i>Hieracium schmidtii</i> Tausch, 1828	VU	D2 + B2ab(i,ii,iv)	
<i>Hieracium serratifolium</i> Jord. ex Boreau, 1857	DD		
<i>Hieracium similatatum</i> Jord. ex Boreau, 1857	DD		
<i>Hieracium umbellatum</i> L. var. <i>alsaticum</i> (G. Rouy) V. Rastetter	NA		
<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	LC		
<i>Hieracium villosum</i> Jacq., 1762	NA		
<i>Hieracium vogesiacum</i> (Kirschl.) Moug. ex Fr., 1848	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Hieracium vulgatum</i> Fr., 1819	LC		
<i>Hieracium vulgatum</i> subsp. <i>purpureoviolascens</i> Zahn, 1921	NA		
<i>Hieracium x densiflorum</i> Tausch, 1828	VU	D2	
<i>Hieracium x fallax</i> Willd., 1809	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Hieracium x visianii</i> (F.W.Schultz & Sch.Bip.) Schinz & Thell., 1923	NA		
<i>Hieracium x zizianum</i> Tausch, 1828	DD		
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	LC		
<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	LC		
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989	NT	pr.B(1+2)b(iii)	
<i>Hippophae rhamnoides</i> L., 1753	LC		
<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss., 1847	NA		
<i>Holandrea carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997	VU	D2	
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	LC		
<i>Holcus mollis</i> L., 1759	LC		
<i>Holosteum umbellatum</i> L., 1753	LC		
<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass., 1821	NA		
<i>Honorius nutans</i> (Sm.) Gray, 1821	VU	D2 + B(1+2)ab(iii)	cultivé!
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885	LC		
<i>Hordeum bulbosum</i> subsp. <i>nodosum</i> (L.) B.R.Baum, 1985	NA		
<i>Hordeum distichon</i> L., 1753	NA		
<i>Hordeum jubatum</i> L., 1753	NA		
<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	LC		
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	VU	D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Hordeum vulgare</i> L., 1753	NA		
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	EN	B(1+2)b(iii)c(iii)	
<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	LC		
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829	LC		
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	NA		
<i>Hyacinthus orientalis</i> L., 1753	NA		
<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser., 1830	NA		
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	CR	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Hylotelephium argutum</i> (Haw.) Holub, 1979	NA		
<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub, 1978	NA		
<i>Hylotelephium spectabile</i> (Boreau) H.Ohba, 1977	NA		
<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba, 1977	LC		
<i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753	NA		
<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	NA		
<i>Hypericum calycinum</i> L., 1767	NA		
<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	LC		
<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	LC		
<i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763	LC		
<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	LC		
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	LC		
<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	LC		
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	LC		
<i>Hypericum x desetangsii</i> Lamotte, 1874	DD		
<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	VU	B2ab(i,iii) + D2	
<i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(iii)	
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	LC		
<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	NA		
<i>Iberis amara</i> L., 1753	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Iberis sempervirens</i> L., 1753	NA		
<i>Iberis umbellata</i> L., 1753	NA		
<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	LC		
<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Impatiens balfourii</i> Hook.f., 1903	NA		
<i>Impatiens capensis</i> Meerb., 1775	NA		
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle, 1833	NA		
<i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	LC		
<i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Imperatoria ostruthium</i> L., 1753	NA		
<i>Inula britannica</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Inula conyza</i> DC., 1836	LC		
<i>Inula helenium</i> L., 1753	NA		
<i>Inula hirta</i> L., 1753	EN	C2a(i)	
<i>Inula salicina</i> L., 1753	LC		
<i>Ipomoea lacunosa</i> L., 1753	NA		
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth, 1787	NA		
<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	NA		
<i>Iris germanica</i> L., 1753	NA		
<i>Iris pallida</i> Lam., 1789	NA		
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	LC		
<i>Iris sibirica</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii,v)	mesures!
<i>Isatis tinctoria</i> L., 1753	LC		
<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	NA		
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	LC		
<i>Iva xanthiifolia</i> Nutt., 1818	NA		
<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	LC		
<i>Jacobaea erratica</i> (Bertol.) Fourr., 1868	VU	B2ab(iii)+ D2	
<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	LC		
<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelsér & Meijden, 2005	NA		
<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	NT	pr.D2 + pr.B(1+2)b(iii)	
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	LC		
<i>Jasione laevis</i> Lam., 1779	VU	B2ab(i) + D2	
<i>Jasione montana</i> L., 1753	LC		
<i>Jasminum fruticans</i> L., 1753	NA		
<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl., 1846	NA		
<i>Juglans nigra</i> L., 1753	NA		
<i>Juglans regia</i> L., 1753	NA		
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	LC		
<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix, 1785	NT	pr.D2	
<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	LC		
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	LC		
<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	LC		
<i>Juncus compressus</i> Jacq., 1762	LC		
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	LC		
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	LC		
<i>Juncus filiformis</i> L., 1753	VU	D2 + B2ab(v)	
<i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	LC		
<i>Juncus ranarius</i> Songeon & Perrier, 1860	NA		
<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	LC		
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	LC		
<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	NA		
<i>Juniperus communis</i> L., 1753	LC		
<i>Juniperus sabina</i> L., 1753	NA		
<i>Kadenia dubia</i> (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tikhom., 1986	EN	B(1+2)ab(i,iii,ii,iv)	mesures!
<i>Kerria japonica</i> (L.) DC., 1818	NA		
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827	LC		
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827	LC		
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	LC		
<i>Knautia dipsacifolia</i> (Host) Kreutzer, 1840	LC		
<i>Knautia godetii</i> Reut., 1857	NA		
<i>Knautia gracilis</i> Szabó, 1911	DD		
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824	LC		
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv., 1812	LC		
<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm., 1772	NA		
<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	NA		
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835	NA		
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	NA		
<i>Lactuca alpina</i> (L.) Benth. & Hook.f., 1876	LC		
<i>Lactuca macrophylla</i> (Willd.) A.Gray, 1847	NA		
<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791	LC		
<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	CR	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Lactuca plumieri</i> (L.) Gren. & Godr., 1850	NT	pr.D2	
<i>Lactuca saligna</i> L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Lactuca sativa</i> L., 1753	NA		
<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	LC		
<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	LC		
<i>Lamium album</i> L., 1753	LC		
<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	LC		
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	LC		
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	LC		
<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	LC		
<i>Lantana camara</i> L., 1753	NA		
<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	EN	B2ab(i,ii,iv)c(iv)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke	NA		
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 1827	EN	B2ac(ii,iii) (-1)	
Lapsana communis L., 1753	LC		
Larix decidua Mill., 1768	NA		
Laserpitium latifolium L., 1753	LC		
Laserpitium prutenicum L., 1753	RE		
Lathraea squamaria L., 1753	LC		
Lathyrus aphaca L., 1753	LC		
Lathyrus hirsutus L., 1753	NT	pr.C2a(i)	
Lathyrus latifolius L., 1753	NA		
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971	LC		
Lathyrus niger (L.) Bernh., 1800	NT	pr.D2	
Lathyrus nissolia L., 1753	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
Lathyrus odoratus L., 1753	NA		
Lathyrus palustris L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii)	
Lathyrus pratensis L., 1753	LC		
Lathyrus sativus L., 1753	NA		
Lathyrus sphaericus Retz., 1783	NA		
Lathyrus sylvestris L., 1753	LC		
Lathyrus tuberosus L., 1753	LC		
Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800	LC		
Laurus nobilis L., 1753	NA		
Lavandula angustifolia Mill., 1768	NA		
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788	LC		
Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800	CR	B(1+2)ab(i,iii)	
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785	EN	B(1+2)b(iii,iv) c(iv)	
Lemna gibba L., 1753	LC		
Lemna minor L., 1753	LC		
Lemna minuta Kunth, 1816	NA		
Lemna trisulca L., 1753	LC		
Lemna turionifera Landolt, 1975	NA		
Leontodon hispidus L., 1753	LC		
Leontodon incanus (L.) Schrank, 1786	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Leontodon saxatilis Lam., 1779	NT	pr.D2	
Leonurus cardiaca L., 1753	VU	D2	
Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812	LC		
Lepidium densiflorum Schrad., 1832	NA		
Lepidium didymum L., 1767	NA		
Lepidium draba L., 1753	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Lepidium graminifolium L., 1759	NA		
Lepidium latifolium L., 1753	NA		
Lepidium perfoliatum L., 1753	NA		
Lepidium ruderales L., 1753	NA		
Lepidium sativum L., 1753	NA		
Lepidium squamatum Forssk., 1775	VU	B(1+2)ab(i,iii) + D2	
Lepidium virginicum L., 1753	NA		
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev, 1961	NA		
Leucanthemum atratum subsp. ceratophylloides (All.) Horvatic, 1935	NA		
Leucanthemum ircutianum DC., 1838	NA		
Leucanthemum vulgare Lam., 1779	LC		
Leucojum aestivum L., 1759	CR	B2ab(i,ii,iii,iv) + D1	cultivé!
Leucojum vernalis L., 1753	LC		
Levisticum officinale W.D.J.Koch, 1824	NA		
Leymus arenarius (L.) Hochst., 1848	NA		
Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz, 1949	NT	pr.D2	
Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810	NA		
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844	NA		
Ligustrum vulgare L., 1753	LC		
Lilium martagon L., 1753	NT	pr.A3e	
Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799	RE		
Limosella aquatica L., 1753	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
Linaria arvensis (L.) Desf., 1799	RE		
Linaria repens (L.) Mill., 1768	LC		
Linaria simplex (Willd.) DC., 1805	NA		
Linaria supina (L.) Chaz., 1790	NA		
Linaria vulgaris Mill., 1768	LC		
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935	NA		
Lindernia palustris Hartmann, 1767	EN	B2ab(i,ii,iv)	
Linum austriacum L., 1753	NA		
Linum catharticum L., 1753	LC		
Linum tenuifolium L., 1753	NT	pr.B2b(iii)	
Linum usitatissimum L., 1753	NA		
Liparis loeselii (L.) Rich., 1817	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Liquidambar styraciflua L., 1753	NA		
Liriodendron tulipifera L., 1753	NA		
Listera cordata (L.) R.Br., 1813	NT	pr.D2	
Listera ovata (L.) R.Br., 1813	LC		
Lithospermum officinale L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Lobularia maritima (L.) Desv., 1815	NA		
Lolium multiflorum Lam., 1779	LC		
Lolium perenne L., 1753	LC		
Lolium temulentum L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988	VU	D2	
Lonicera alpigena L., 1753	CR	D1	
Lonicera caprifolium L., 1753	NA		
Lonicera japonica Thunb., 1784	NA		
Lonicera nigra L., 1753	LC		
Lonicera nitida E.H.Wilson, 1911	NA		
Lonicera periclymenum L., 1753	LC		
Lonicera pileata Oliv., 1887	NA		
Lonicera tatarica L., 1753	NA		
Lonicera xylosteum L., 1753	LC		
Lotus corniculatus L., 1753	LC		
Lotus corniculatus subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887	LC		
Lotus pedunculatus Cav., 1793	LC		
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	NA		
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817	EN	B2ac(iv)	mesures!
Lunaria annua L., 1753	NA		
Lunaria rediviva L., 1753	LC		
Lupinus luteus L., 1753	NA		
Lupinus polyphyllus Lindl., 1827	NA		
Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr., 1947	NA		
Luzula campestris (L.) DC., 1805	LC		
Luzula desvauxii Kunth, 1841	LC		
Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806	LC		
Luzula lutea (All.) DC., 1805	NA		
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott, 1938	LC		
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811	LC		
Luzula pilosa (L.) Willd., 1809	LC		
Luzula rubella Wender., 1839	LC		
Luzula sudetica (Willd.) Schult., 1814	NT	pr.D2	
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811	LC		
Lycium barbarum L., 1753	NA		
Lycium chinense Mill., 1768	NA		
Lycium europaeum L., 1753	NA		
Lycopersicon esculentum Mill., 1768	NA		
Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Lycopodium annotinum L., 1753	LC		
Lycopodium clavatum L., 1753	LC		
Lycopsis arvensis L., 1753	LC		
Lycopus europaeus L., 1753	LC		
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009	LC		
Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb., 2009	NA		
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009	EN	B(1+2)b(ii,iv)c(iv)	
Lysimachia nemorum L., 1753	LC		
Lysimachia nummularia L., 1753	LC		
Lysimachia punctata L., 1753	NA		
Lysimachia thyrsoflora L., 1753	NA		
Lysimachia vulgaris L., 1753	LC		
Lythrum hyssopifolia L., 1753	EN	B(1+2)b(ii,iv)c(iv)	
Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967	LC		
Lythrum salicaria L., 1753	LC		
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., 1906	NA		
Magnolia denudata Desr., 1792	NA		
Magnolia grandiflora L., 1759	NA		
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod., 1827	NA		
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt., 1818	NA		
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794	LC		
Malus domestica Borkh., 1803	NA		
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte, 1864	NA		
Malus sylvestris Mill., 1768	LC		
Malva alcea L., 1753	LC		
Malva dendromorpha M.F.Ray, 1998	NA		
Malva moschata L., 1753	LC		
Malva neglecta Wallr., 1824	LC		
Malva pusilla Sm., 1795	DD		
Malva sylvestris L., 1753	LC		
Marrubium vulgare L., 1753	CR	B2ab(i,ii,iv)	
Marsilea quadrifolia L., 1753	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
Matricaria discoidea DC., 1838	NA		
Matricaria maritima L., 1753	LC		
Matricaria recutita L., 1753	LC		
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., 1866	VU	D1	
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex L.) Maire, 1932	NA		
Meconopsis cambrica (L.) Vig., 1814	NA		
Medicago arabica (L.) Huds., 1762	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Medicago lupulina L., 1753	LC		
Medicago minima (L.) L., 1754	LC		
Medicago polymorpha L., 1753	NA		
Medicago sativa L., 1753	LC		
Melampyrum arvense L., 1753	LC		
Melampyrum cristatum L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii)	
Melampyrum pratense L., 1753	LC		
Melampyrum sylvaticum L., 1753	LC		
Melica ciliata L., 1753	LC		
Melica nutans L., 1753	LC		
Melica transilvanica Schur, 1866	EN	B(1+2)ab(iii)	
Melica uniflora Retz., 1779	LC		
Melilotus albus Medik., 1787	LC		
Melilotus altissimus Thuill., 1799	LC		
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779	LC		
Melissa officinalis L., 1753	NA		
Melittis melissophyllum L., 1753	LC		
Mentha aquatica L., 1753	LC		
Mentha arvensis L., 1753	LC		
Mentha longifolia (L.) Huds., 1762	LC		
Mentha micrantha F.W. Schultz	NA		
Mentha mollis F.W. Schultz	NA		
Mentha pulegium L., 1753	VU	D2	
Mentha spicata L., 1753	NA		
Mentha suaveolens Ehrh., 1792	NA		
Mentha x carinthiaca Host, 1831	NA		
Mentha x dumetorum Schult., 1809	DD		
Mentha x niliaca Juss. ex Jacq., 1777	NA		
Mentha x piperita L., 1753	NA		
Mentha x verticillata L., 1759	DD		
Mentha x villosa Huds., 1778	NA		
Menyanthes trifoliata L., 1753	NT	pr.D2	
Mercurialis annua L., 1753	LC		
Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe	NA		
Mercurialis perennis L., 1753	LC		
Mercurialis tomentosa L., 1753	NA		
Mespilus germanica L., 1753	NA		
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng, 1948	NA		
Meum athamanticum Jacq., 1776	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844	VU	D2	répartition!
<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973	LC		
<i>Milium effusum</i> L., 1753	LC		
<i>Mimulus guttatus</i> Fisch. ex DC., 1813	NA		
<i>Mimulus moschatus</i> Douglas ex Lindl., 1828	NA		
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936	NT	pr.B(1+2)c(iv)	
<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill, 1963	EN	B2b(iii)c(iv)	
<i>Mirabilis jalapa</i> L., 1753	NA		
<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson, 1855	NA		
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840	EN	B2b(iii)c(iv)	
<i>Moehringia muscosa</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	LC		
<i>Moenchia erecta</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	CR	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	LC		
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A.Gray, 1848	RE		
<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753	LC		
<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>fontana</i>	DD		
<i>Montia fontana</i> L., 1753	LC		
<i>Montia fontana</i> subsp. <i>amporitana</i> Sennen, 1911	DD		
<i>Montia fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> (Fenzl) Walters, 1953	VU	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Morus alba</i> L., 1753	NA		
<i>Morus nigra</i> L., 1753	NA		
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill., 1768	NT	pr.D2	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842	LC		
<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt, 1794	EN	D1	
<i>Myosotis arvensis</i> Hill, 1764	LC		
<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	NT	pr.A2c	
<i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818	NT	pr.D2	
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser, 1821	LC		
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	LC		
<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	LC		
<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roem. & Schult., 1819	VU	D2	
<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm., 1791	LC		
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794	LC		
<i>Myosurus minimus</i> L., 1753	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv., 1824	VU	D2	
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	CR	B(1+2)ab(ii,iv)	
<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	LC		
<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop., 1771	NA		
<i>Najas marina</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Najas minor</i> All., 1773	VU	D2	
<i>Narcissus poeticus</i> L., 1753	NA		
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	LC		
<i>Narcissus x incomparabilis</i> Mill., 1768	NA		
<i>Nardus stricta</i> L., 1753	LC		
<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb., 1832	DD		
<i>Nasturtium officinale</i> R.Br., 1812	LC		
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	VU	D1	
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	LC		
<i>Nepeta cataria</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iv) + D2	cultivé!
<i>Neslia apiculata</i> Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall., 1842	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn., 1791	NA		
<i>Nicotiana rustica</i> L., 1753	NA		
<i>Nicotiana tabacum</i> L., 1753	NA		
<i>Nigella arvensis</i> L., 1753	CR	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Nigella damascena</i> L., 1753	NA		
<i>Nigella gallica</i> Jord., 1852	NA		
<i>Noccaea caerulescens</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey., 1973	NT	pr.D2	
<i>Noccaea montana</i> (L.) F.K.Mey., 1973	EN	B2ab(iii,v)	
<i>Nonea erecta</i> Bernh., 1800	NA		
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	LC		
<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC., 1821	CR	B(1+2)ab(ii,iv)	
<i>Nuphar x spenneriana</i> Gaudin, 1828	NA		
<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	DD		
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891	EN	B2ab(ii,iii,iv)	
<i>Ocimum basilicum</i> L., 1753	NA		
<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv., 1811	EN	B(1+2)b(i,iii)c(iv)	
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	LC		
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798	NT	pr.D2	
<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	NA		
<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	EN	B2ab(ii,iii)	mesures!
<i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Coleman, 1844	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	CR	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	EN	B2ab(ii,iii)	
<i>Oenothera biennis</i> L., 1753	LC		
<i>Oenothera deflexa</i> R.R. Gates	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Oenothera ersteinensis</i> R.Linder & R.Jean, 1970	NA		
<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli, 1875	NA		
<i>Oenothera grandiflora</i> L'Hér. ex Aiton, 1789	NA		
<i>Oenothera issleri</i> Renner ex Rostanski, 1965	NA		
<i>Oenothera oakesiana</i> (A.Gray) J.W.Robbins ex S.Watson & Coult., 1890	NA		
<i>Oenothera parviflora</i> L., 1759	NA		
<i>Oenothera suaveolens</i> Desf. ex Pers., 1805	DD		
<i>Oenothera subterminalis</i> R.R.Gates, 1936	NA		
<i>Oenothera villosa</i> subsp. <i>strigosa</i> (Rydb.) W.Dietr. & P.H.Raven, 1977	NA		
<i>Oenothera x fallax</i> Renner, 1917	NA		
<i>Olea europaea</i> L., 1753	NA		
<i>Omphalodes verna</i> Moench, 1794	NA		
<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit. ex Willd.) DC., 1825	NA		
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772	NA		
<i>Ononis natrix</i> L., 1753	NA		
<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	LC		
<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937	LC		
<i>Onopordum acanthium</i> L., 1753	LC		
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	VU	C2b	
<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	LC		
<i>Ophrys araneola</i> Rchb., 1830	CR	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv) + C2b	
<i>Ophrys aranifera</i> Huds., 1778	EN	C2a(i)	
<i>Ophrys aymoninii</i> (Breistr.) Buttler, 1986	NA		
<i>Ophrys elatior</i> Gump. ex Paulus, 1996	EN	B(1+2)ab(iii)c(iv)	mesures!
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	LC		
<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All., 1785	NT	pr.D2	mesures!
<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	LC		
<i>Orchis militaris</i> L., 1753	LC		
<i>Orchis pallens</i> L., 1771	CR	A1a + D1	
<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	LC		
<i>Orchis simia</i> Lam., 1779	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	LC		
<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800	NT	pr.D2	
<i>Origanum majorana</i> L., 1753	NA		
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	LC		
<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	CR	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Ornithogalum angustifolium</i> Boreau, 1847	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L., 1753	LC		
<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753	LC		
<i>Ornithopus sativus</i> Brot., 1804	NA		
<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800	DD		
<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl., 1836	VU	D(1+2)	mesures!
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	VU	B2ab(i,iii) + D2	
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798	LC		
<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan	NA		
<i>Orobanche elatior</i> Sutton, 1798	DD		
<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	CR	D1	
<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828	VU	D2	
<i>Orobanche lutea</i> Baumg., 1816	LC		
<i>Orobanche minor</i> Sm., 1797	NT	pr.D2	
<i>Orobanche rapum-genistæ</i> Thuill., 1799	LC		
<i>Orobanche reticulata</i> Wallr., 1825	VU	D2	
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829	VU	D2 + B2ab(iii,iv)	
<i>Orthilia secunda</i> (L.) House, 1921	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	NT	pr.C2a(i)	
<i>Othocallis siberica</i> (Haw.) Speta, 1998	NA		
<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	LC		
<i>Oxalis corniculata</i> L., 1753	LC		
<i>Oxalis dillenii</i> Jacq., 1794	NA		
<i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835	NA		
<i>Paeonia officinalis</i> L., 1753	NA		
<i>Panicum capillare</i> L., 1753	NA		
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803	NA		
<i>Panicum miliaceum</i> L., 1753	NA		
<i>Papaver argemone</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Papaver dubium</i> L., 1753	LC		
<i>Papaver hybridum</i> L., 1753	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Papaver orientale</i> L., 1753	NA		
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	LC		
<i>Papaver somniferum</i> L., 1753	NA		
<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	NA		
<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	NA		
<i>Parietaria officinalis</i> L., 1753	NA		
<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753	LC		
<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	NT	Pr.D2 + pr.B(1+2)b(i,iii)	répartition!
<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 1922	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887	NA		
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887	NA		
Pastinaca sativa L., 1753	LC		
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841	NA		
Pedicularis foliosa L., 1767	VU	D2	
Pedicularis palustris L., 1753	EN	B2ab(i,ii,iv) + D1	
Pedicularis sylvatica L., 1753	VU	D2	
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng., 1824	NA		
Perovskia atriplicifolia Benth.	NA		
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821	LC		
Persicaria bistorta (L.) Samp., 1913	LC		
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841	LC		
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800	LC		
Persicaria maculosa Gray, 1821	LC		
Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852	LC		
Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966	LC		
Persicaria orientalis (L.) Spach, 1841	NA		
Persicaria polystachya (C.F.W.Meissn.) H.Gross, 1913	NA		
Petasites albus (L.) Gaertn., 1791	LC		
Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	LC		
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	LC		
Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 1829	NA		
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill, 1925	NA		
Petunia x punctata Paxton, 1842	NA		
Peucedanum officinale L., 1753	NT	pr.D2	mesures!
Phacelia tanacetifolia Benth., 1837	NA		
Phalaris arundinacea L., 1753	LC		
Phalaris canariensis L., 1753	NA		
Phaseolus vulgaris L., 1753	NA		
Phedimus spurius (M.Bieb) 't Hart, 1995	NA		
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, 1867	LC		
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, 1874	RE		
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják, 1972	VU	D2	
Phelipanche ramosa (L.) Pomel, 1874	EN	D1 + B2ac(iii,v)	
Philadelphus coronarius L., 1753	NA		
Phleum arenarium L., 1753	NA		
Phleum paniculatum Huds., 1762	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	
Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880	VU	D2	
Phleum pratense L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Phlox paniculata L., 1753	NA		
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	LC		
Physalis alkekengi L., 1753	DD		
Physalis alkekengi var. franchetii (Mast.) Makino, 1908	NA		
Physalis peruviana L., 1763	NA		
Physalis pubescens L., 1753	NA		
Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, 1793	NA		
Phyteuma orbiculare L., 1753	NT	pr.D2	
Phyteuma spicatum L., 1753	LC		
Phytolacca americana L., 1753	NA		
Phytolacca esculenta Houtt.	NA		
Picea abies (L.) H.Karst., 1881	LC		
Picea sitchensis (Bong.) Carrière, 1855	NA		
Picris hieracioides L., 1753	LC		
Pieris japonica (Thunb.) G.Don	NA		
Pilularia globulifera L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Pimpinella anisum L., 1753	NA		
Pimpinella major (L.) Huds., 1762	LC		
Pimpinella peregrina L., 1753	NA		
Pimpinella saxifraga L., 1753	LC		
Pinguicula vulgaris L., 1753	VU	D2	
Pinus cembra L., 1753	NA		
Pinus mugo Turra, 1764	NA		
Pinus nigra Arnold, 1785	NA		
Pinus strobus L., 1753	NA		
Pinus sylvestris L., 1753	LC		
Pistia stratiotes L., 1753	NA		
Pisum sativum L., 1753	NA		
Pisum sativum var. arvense (L.) Poir., 1804	EN	D1	cultivé!
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811	NA		
Plantago coronopus L., 1753	NA		
Plantago lanceolata L., 1753	LC		
Plantago major L., 1753	LC		
Plantago media L., 1753	LC		
Plantago scabra Moench, 1794	VU	D2	
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817	LC		
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828	LC		
Platanthera x hybrida Brügger, 1882	NA		
Platanus orientalis L., 1753	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770	NA		
Platycladus orientalis (L.) Franco, 1949	NA		
Poa alpina L., 1753	NA		
Poa annua L., 1753	LC		
Poa bulbosa L., 1753	LC		
Poa chaixii Vill., 1786	LC		
Poa compressa L., 1753	LC		
Poa nemoralis L., 1753	LC		
Poa palustris L., 1759	LC		
Poa pratensis L., 1753	LC		
Poa supina Schrad., 1806	DD		
Poa trivialis L., 1753	LC		
Polemonium caeruleum L., 1753	VU	D2	
Polycnemum arvense L., 1753	RE		
Polycnemum majus A.Braun, 1841	CR	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
Polygala amarella Crantz, 1769	NT	pr.D2	
Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837	VU	D2 + B(1+2)ab(iii)	
Polygala comosa Schkuhr, 1796	LC		
Polygala serpyllifolia Hose, 1797	LC		
Polygala vulgaris L., 1753	LC		
Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785	LC		
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906	LC		
Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785	LC		
Polygonum aviculare L., 1753	LC		
Polygonum bellardii All., 1785	NA		
Polypodium interjectum Shivas, 1961	DD		
Polypodium vulgare L., 1753	LC		
Polypodium x mantoniae Rothm. & U.Schneid., 1962	DD		
Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966	NA		
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799	LC		
Polystichum braunii (Spenn.) Fée, 1852	CR	D1	
Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799	CR	D1	
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	LC		
Polystichum x bicknellii (H.Christ) Hahne, 1905	DD		
Poncirus trifoliata (L.) Raf., 1838	NA		
Populus alba L., 1753	LC		
Populus balsamifera L., 1753	NA		
Populus nigra L., 1753	LC		
Populus tremula L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Populus x canadensis</i> Moench, 1785	NA		
<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	NA		
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link, 1818	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb., 1804	VU	D2	
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber, 1838	LC		
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	VU	D2	
<i>Potamogeton compressus</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Potamogeton crispus</i> L., 1753	LC		
<i>Potamogeton friesii</i> Rupr., 1845	EN	B(1+2)b(ii,iv)c(iv)	
<i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Potamogeton helveticus</i> (G.Fisch.) E.Baumann, 1925	NT	pr.D2	
<i>Potamogeton lucens</i> L., 1753	LC		
<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	LC		
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816	LC		
<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W.D.J.Koch, 1823	VU	D2	
<i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753	LC		
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L., 1753	LC		
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	VU	D2	
<i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753	LC		
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schldl., 1827	VU	D2	
<i>Potamogeton x bennettii</i> Fryer, 1895	NA		
<i>Potamogeton x fluitans</i> Roth, 1788	DD		
<i>Potamogeton x variifolius</i> Thore, 1803	NA		
<i>Potamogeton x zizii</i> W.D.J.Koch ex Roth, 1827	DD		
<i>Potentilla alba</i> L., 1753	EN	B2ab(iii)	
<i>Potentilla alsatica</i> T.Gregor, 2004	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	LC		
<i>Potentilla argentea</i> L., 1753	LC		
<i>Potentilla cinerea</i> Chaix ex Vill., 1779	LC		
<i>Potentilla collina</i> Wibel, 1799	DD		
<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Beck ex Fritsch, 1897	EN	B2ab(iii)	
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797	LC		
<i>Potentilla fruticosa</i> L., 1753	NA		
<i>Potentilla heptaphylla</i> L., 1755	EN	B2ab(iii)	
<i>Potentilla inclinata</i> Vill., 1788	VU	D2	
<i>Potentilla intermedia</i> L., 1767	NA		
<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC., 1805	LC		
<i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816	DD		
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Potentilla neumanniana Reichenb. var. billotii (J.N. Boulay) V. Rastetter	NA		
Potentilla neumanniana Reichenb. var. incisa (Tausch) M. Hoff comb. nov.	NA		
Potentilla neumanniana Reichenb. var. pseudoincisa (Th. Wolf) M. Hoff comb. nov.	NA		
Potentilla norvegica L., 1753	NA		
Potentilla palustris (L.) Scop., 1771	LC		
Potentilla pusilla Host, 1831	DD		
Potentilla recta L., 1753	LC		
Potentilla reptans L., 1753	LC		
Potentilla rhenana P.J. Müller ex Zimmeter	NA		
Potentilla rupestris L., 1753	EN	B2ab(iii)	
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856	LC		
Potentilla supina L., 1753	LC		
Potentilla x subarenaria Zimmeter, 1884	DD		
Prenanthes purpurea L., 1753	LC		
Primula elatior (L.) Hill, 1765	LC		
Primula veris L., 1753	LC		
Primula vulgaris Huds., 1762	NA		
Prospero autumnale (L.) Speta, 1982	VU	D2	
Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775	LC		
Prunella laciniata (L.) L., 1763	VU	C2a(i)	
Prunella vulgaris L., 1753	LC		
Prunella x dissecta Wender., 1831	NA		
Prunella x intermedia Link, 1791	NA		
Prunus armeniaca L., 1753	NA		
Prunus avium (L.) L., 1755	LC		
Prunus cerasifera Ehrh., 1784	NA		
Prunus cerasus L., 1753	NA		
Prunus domestica L., 1753	NA		
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967	NA		
Prunus laurocerasus L., 1753	NA		
Prunus mahaleb L., 1753	LC		
Prunus padus L., 1753	LC		
Prunus padus subsp. borealis Nyman, 1878	NT	pr.D2	
Prunus persica (L.) Batsch, 1801	NA		
Prunus serotina Ehrh., 1788	NA		
Prunus serrulata Lindl., 1830	NA		
Prunus spinosa L., 1753	LC		
Prunus tenella Batsch, 1801	NA		
Prunus virginiana L., 1753	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Prunus x cerea</i> (L.) Ehrh., 1792	NA		
<i>Prunus x fruticans</i> Weihe, 1826	LC		
<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh., 1797	NA		
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á.Löve & D.Löve, 1969	LC		
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950	NA		
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	LC		
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach, 1834	NA		
<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl., 1850	NA		
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	LC		
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	EN	B2ab(ii,iii,iv)c(iv)	
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord., 1854	NA		
<i>Pulmonaria angustifolia</i> L., 1753	NA		
<i>Pulmonaria mollis</i> Wulfen ex Hornem., 1813	NT	pr.D2	
<i>Pulmonaria montana</i> Lej., 1811	NT	pr.D2	
<i>Pulmonaria obscura</i> Dumort., 1865	LC		
<i>Pulmonaria officinalis</i> L., 1753	NA		
<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre, 1800	VU	D2	
<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>alba</i> Zamelis, 1926	VU	D2	
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill., 1768	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	EN	B(1+2)ab(iii)	répartition!
<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem., 1847	NA		
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw., 1810	RE		
<i>Pyrola media</i> Sw., 1804	CR	B(1+2)ab(ii,iv)	
<i>Pyrola minor</i> L., 1753	NT	pr.A2c	
<i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Pyrus communis</i> L., 1753	NA		
<i>Pyrus cordata</i> Desv., 1818	NA		
<i>Pyrus nivalis</i> Jacq., 1774	DD		
<i>Pyrus pyraister</i> (L.) Du Roi, 1772	LC		
<i>Pyrus spinosa</i> Forssk., 1775	NA		
<i>Quercus cerris</i> L., 1753	NA		
<i>Quercus ilex</i> L., 1753	NA		
<i>Quercus palustris</i> Münchh., 1770	NA		
<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	LC		
<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	LC		
<i>Quercus robur</i> L., 1753	LC		
<i>Quercus rubra</i> L., 1753	NA		
<i>Quercus x rosacea</i> Bechst., 1813	LC		
<i>Quercus x streimeri</i> Heuff. ex Freyn, 1878	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Radiola linoides Roth, 1788	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Ranunculus aconitifolius L., 1753	LC		
Ranunculus acris L., 1753	LC		
Ranunculus alsaticus W.Koch, 1939	DD		
Ranunculus aquatilis L., 1753	NT	pr.D2	
Ranunculus arvensis L., 1753	EN	B(1+2)b(i,iii)c(iv)	
Ranunculus auricomus L., 1753	LC		
Ranunculus auricomus subsp. ascendens R.Engel, 1968	NA		
Ranunculus auricomus subsp. leptomeris Haas, 1962	NA		
Ranunculus auricomus subsp. nicklesii Engel, 1968	NA		
Ranunculus breyninus Crantz, 1763	DD		
Ranunculus bulbosus L., 1753	LC		
Ranunculus bullatus L., 1753	NA		
Ranunculus carinthiacus Hoppe, 1826	NA		
Ranunculus circinatus Sibth., 1794	LC		
Ranunculus ficaria L., 1753	LC		
Ranunculus ficaria subsp. ficariiformis Rouy & Foucaud, 1893	NA		
Ranunculus flammula L., 1753	LC		
Ranunculus fluitans Lam., 1779	LC		
Ranunculus gratiosus Brodthb., 1998	DD		
Ranunculus hederaceus L., 1753	RE		
Ranunculus lingua L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
Ranunculus lingulatus Brodthb., 1998	DD		
Ranunculus montanus Willd., 1799	NA		
Ranunculus peltatus Schrank, 1789	NT	pr.D2	
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., 1874	NA		
Ranunculus platanifolius L., 1767	LC		
Ranunculus polyanthemoides Boreau, 1857	DD		
Ranunculus polyanthemus L.	NA		
Ranunculus repens L., 1753	LC		
Ranunculus reptans L., 1753	NA		
Ranunculus rionii Lagger, 1848	VU	D2	
Ranunculus sardous Crantz, 1763	VU	D2 + B(1+2)ab(iii)	
Ranunculus sceleratus L., 1753	LC		
Ranunculus sphinx Brodthb., 1998	NA		
Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785	LC		
Ranunculus tuberosus Lapeyr., 1813	LC		
Raphanus raphanistrum L., 1753	LC		
Raphanus sativus L., 1753	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Rapistrum rugosum (L.) All., 1785	NA		
Reseda glauca L., 1753	NA		
Reseda lutea L., 1753	LC		
Reseda luteola L., 1753	LC		
Reseda phyteuma L., 1753	NA		
Reynoutria japonica Houtt., 1777	NA		
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922	NA		
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983	NA		
Rhamnus alpina L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv) + D1	
Rhamnus cathartica L., 1753	LC		
Rhamnus pumila Turra, 1764	NA		
Rheum rhaponticum L., 1753	NA		
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777	LC		
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel., 1806	VU	B2ab(i,ii,iv)	
Rhinanthus glacialis Personnat, 1863	DD		
Rhinanthus minor L., 1756	LC		
Rhodiola rosea L., 1753	CR	D1	
Rhododendron ferrugineum L., 1753	NA		
Rhus typhina L., 1756	NA		
Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805	VU	D2	
Ribes alpinum L., 1753	LC		
Ribes nigrum L., 1753	DD		cultivé!
Ribes petraeum Wulfen, 1781	NT	pr.D2	
Ribes rubrum L., 1753	NA		
Ribes sanguineum Pursh, 1814	NA		
Ribes uva-crispa L., 1753	LC		
Ricinus communis L., 1753	NA		
Robinia hispida L., 1767	NA		
Robinia pseudoacacia L., 1753	NA		
Roegneria canina (L.) Nevski, 1934	LC		
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821	LC		
Rorippa austriaca (Crantz) Besser, 1821	NA		
Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900	NA		
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821	LC		
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., 1838	NT	pr.D2	
Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821	LC		
Rorippa x anceps (Wahlenb.) Rchb., 1837	DD		
Rosa agrestis Savi, 1798	NT	pr.D2	
Rosa arvensis Huds., 1762	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Rosa caesia Sm., 1812	DD		
Rosa canina L. var. diversiglandulosa R. Keller	NA		
Rosa canina L., 1753	LC		
Rosa corymbifera Borckhausen var. thuilleri Christ	NA		
Rosa corymbifera Borkh., 1790	LC		
Rosa dumalis Bechst., 1810	DD		
Rosa elliptica Tausch, 1819	NT	pr.D2	
Rosa ferruginea Vill., 1779	NT	pr.D2	
Rosa gallica L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
Rosa majalis Herrm., 1762	LC		
Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812	DD		
Rosa montana Chaix, 1785	NA		
Rosa multiflora Thunb., 1784	NA		
Rosa obtusifolia Desv., 1809	DD		
Rosa pendulina L., 1753	LC		
Rosa pimpinellifolia L., 1759	NT	pr.D2	
Rosa rubiginosa L., 1771	LC		
Rosa rugosa Thunb., 1784	NA		
Rosa stylosa Desv., 1809	NT	pr.D2	
Rosa tomentosa Sm., 1800	LC		
Rosa trachyphylla Rau, 1816	VU	D2	
Rosa villosa L., 1753	VU	D2	
Rosa vosagiaca Desp., 1828	DD		
Rosa x dumetorum Thuill., 1799	DD		
Rosa x scabriuscula Sm., 1808	NA		
Rosmarinus officinalis L., 1753	NA		
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971	NA		
Rubia peregrina L., 1753	NA		
Rubia tinctorum L., 1753	NA		
Rubus armeniacus Focke, 1874	NA		
Rubus bifrons Vest ex Tratt., 1823	DD		
Rubus caesius L., 1753	LC		
Rubus canescens DC., 1813	LC		
Rubus chaerophyllus Sagorski & W.Schultze, 1894	NA		
Rubus cinerascens Weihe ex Lej., 1831	DD		
Rubus divaricatus P.J.Mull., 1858	DD		
Rubus elegantispinosus (A.Schumach.) H.E.Weber, 1974	NA		
Rubus fissipetalus P.J. Müller	NA		
Rubus fruticosus L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Rubus gremlii Focke, 1877	DD		
Rubus hirtus Waldst. & Kit., 1805	DD		
Rubus idaeus L., 1753	LC		
Rubus koehleri Weihe, 1825	NA		
Rubus laciniatus (Weston) Willd., 1806	NA		
Rubus leiningeri W. Lang	NA		
Rubus macrophyllus Weihe & Nees, 1824	DD		
Rubus menkei Weihe, 1825	DD		
Rubus montanus Lib. ex Lej., 1813	DD		
Rubus mougeotii Billot ex F.W. Schultz	NA		
Rubus mucronulatus Boreau, 1857	NA		
Rubus nessensis Hall, 1794	DD		
Rubus pedemontanus Pinkw., 1898	DD		
Rubus praecox Bertol., 1842	DD		
Rubus pruinosis Arrh.	DD		
Rubus radula Weihe ex Boenn., 1824	DD		
Rubus rhamnifolius Weihe & Nees, 1822	DD		
Rubus rudis Weihe, 1825	DD		
Rubus saxatilis L., 1753	NT	pr.D2	
Rubus schnedleri H.E. Weber	NA		
Rubus silesiacus Weihe	NA		
Rubus silvaticus Weihe & Nees, 1824	DD		
Rubus tereticaulis P.J.Mull., 1858	DD		
Rubus thyrsoflorus Weihe, 1825	DD		
Rubus ulmifolius Schott, 1818	DD		
Rubus vallisparvus Sudre, 1906	NA		
Rubus vestitus Weihe, 1825	DD		
Rudbeckia hirta L., 1753	NA		
Rudbeckia laciniata L., 1753	NA		
Rumex acetosa L., 1753	LC		
Rumex acetosella L., 1753	LC		
Rumex alpinus L., 1759	NA		
Rumex arifolius All., 1773	LC		
Rumex conglomeratus Murray, 1770	LC		
Rumex crispus L., 1753	LC		
Rumex hydrolapathum Huds., 1778	LC		
Rumex maritimus L., 1753	EN	B(1+2)b(iii)c(iv)	
Rumex obtusifolius L., 1753	LC		
Rumex palustris Sm., 1800	VU	D2	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Rumex patientia L., 1753	NA		
Rumex pulcher L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Rumex sanguineus L., 1753	LC		
Rumex scutatus L., 1753	DD		
Rumex thrysiflorus Fingerh., 1829	LC		
Rumex x pratensis Mert. & W.D.J.Koch, 1826	LC		
Ruta graveolens L., 1753	NA		
Sagina apetala Ard., 1763	LC		
Sagina procumbens L., 1753	LC		
Sagittaria latifolia Willd., 1805	NA		
Sagittaria sagittifolia L., 1753	LC		
Salix alba L., 1753	LC		
Salix appendiculata Vill., 1789	NA		
Salix atrocinnerea Brot., 1804	DD		
Salix aurita L., 1753	LC		
Salix babylonica L., 1753	NA		
Salix bicolor Willd., 1796	VU	D(1+2)	
Salix caesia Vill., 1789	NA		
Salix caprea L., 1753	LC		
Salix cinerea L., 1753	LC		
Salix daphnoides Vill., 1779	EN	C2a(i)	
Salix eleagnos Scop., 1772	LC		
Salix fragilis L., 1753	LC		
Salix hastata L., 1753	NA		
Salix myrsinifolia Salisb., 1796	LC		
Salix pentandra L., 1753	DD		
Salix purpurea L., 1753	LC		
Salix repens L., 1753	CR	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) + D1	
Salix triandra L., 1753	LC		
Salix viminalis L., 1753	LC		
Salix x sepulcralis Simonk., 1890	NA		
Salsola kali var. pontica Pall.	NA		
Salvia glutinosa L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
Salvia officinalis L., 1753	NA		
Salvia pratensis L., 1753	LC		
Salvia sclarea L., 1753	NA		
Salvia verticillata L., 1753	NA		
Salvinia natans (L.) All., 1785	RE		
Sambucus ebulus L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	LC		
<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753	LC		
<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	LC		
<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	LC		
<i>Sanicula europaea</i> L., 1753	LC		
<i>Saponaria ocyroides</i> L., 1753	NA		
<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	LC		
<i>Satureja hortensis</i> L., 1753	NA		
<i>Saxifraga cotyledon</i> L., 1753	NA		
<i>Saxifraga fragosoi</i> Sennen, 1929	NA		
<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	LC		
<i>Saxifraga hirsuta</i> L., 1759	NA		
<i>Saxifraga hypnoides</i> L., 1753	NA		
<i>Saxifraga muscoides</i> All., 1773	NA		
<i>Saxifraga paniculata</i> Mill., 1768	EN	C2a(i)	
<i>Saxifraga rosacea</i> Moench, 1794	EN	B(1+2)ab(ii,iv)	
<i>Saxifraga rosacea</i> subsp. <i>sponhemica</i> (C.C.Gmel.) D.A.Webb, 1963	NA		
<i>Saxifraga rotundifolia</i> L., 1753	NA		
<i>Saxifraga stellaris</i> L., 1753	LC		
<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	LC		
<i>Saxifraga umbrosa</i> L., 1762	NA		
<i>Saxifraga x geum</i> L., 1753	NA		
<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit., 1802	VU	D2	
<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	LC		
<i>Scabiosa columbaria</i> subsp. <i>pratensis</i> (Jord.) Braun-Blanq., 1933	DD		
<i>Scabiosa lucida</i> Vill., 1779	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Scheuchzeria palustris</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii,iv)	
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	LC		
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla, 1888	VU	D2	
<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla, 1888	RE		
<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla, 1888	NA		
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888	NT	pr.D2	
<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla, 1888	VU	D2	
<i>Schoenoplectus x carinatus</i> (Sm.) Palla, 1888	NA		
<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) + D2	mesures!
<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	LC		
<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	LC		
<i>Scleranthus perennis</i> L., 1753	LC		
<i>Scleranthus polycarpus</i> L., 1756	DD		
<i>Sclerochloa dura</i> (L.) P.Beauv., 1812	EN	B2ab(ii,iv)	
<i>Scorzonera hispanica</i> L., 1753	NA		
<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench, 1794	LC		
<i>Scorzoneroides pyrenaica</i> (Gouan) Holub, 1977	LC		
<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Scrophularia canina</i> L., 1753	LC		
<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	LC		
<i>Scrophularia oblongifolia</i> Loisel., 1827	LC		
<i>Scrophularia vernalis</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Scutellaria altissima</i> L., 1753	NA		
<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	LC		
<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) + D2	
<i>Secale cereale</i> L., 1753	NA		
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen, 1989	LC		
<i>Sedum acre</i> L., 1753	LC		
<i>Sedum album</i> L., 1753	LC		
<i>Sedum alpestre</i> Vill., 1779	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Sedum annuum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Sedum cepaea</i> L., 1753	CR	B(1+2)ab(i,ii,iv,v)	
<i>Sedum dasyphyllum</i> L., 1753	EN	D1	
<i>Sedum forsterianum</i> Sm., 1808	NT	pr.D2	
<i>Sedum hispanicum</i> L., 1755	NA		
<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	LC		
<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge, 1835	NA		
<i>Sedum sexangulare</i> L., 1753	LC		
<i>Sedum villosum</i> L., 1753	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	NT	pr.D2	
<i>Sempervivum tectorum</i> L., 1753	NA		
<i>Senecio hercynicus</i> Herborg, 1987	LC		
<i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838	NA		
<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poir., 1789	NA		
<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803	LC		
<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	LC		
<i>Senecio viscosus</i> L., 1753	LC		
<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl., 1847	NA		
<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J.Buchholz, 1939	NA		
<i>Serratula tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>	NT	pr. D2	
<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	NT	pr.D2	répartition!
<i>Serratula tinctoria</i> subsp. <i>monticola</i> (Boreau) Berher, 1887	DD		
<i>Seseli annuum</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Seseli montanum</i> L., 1753	VU	D2	mesures!
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	LC		
<i>Setaria adhaerens</i> (Forssk.) Chiov., 1919	NA		
<i>Setaria faberi</i> F.Herm., 1910	NA		
<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv., 1812	NA		
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817	NA		
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812	NA		
<i>Setaria verticillata</i> var. <i>ambigua</i> (Guss.) Parl., 1845	DD		
<i>Setaria verticillata</i> var. <i>verticillata</i>	NA		
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv., 1812	NA		
<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	LC		
<i>Sibbaldia procumbens</i> L., 1753	EN	D1	
<i>Sida spinosa</i> L., 1753	NA		
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	LC		
<i>Silaum tenuifolium</i> (DC.) Reduron, 2008	NA		
<i>Silene acaulis</i> subsp. <i>bryoides</i> (Jord.) Nyman, 1878	NA		
<i>Silene armeria</i> L., 1753	NA		
<i>Silene conica</i> L., 1753	EN	B2ac(iii,iv)	
<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv., 1811	NA		
<i>Silene dichotoma</i> Ehrh., 1792	NA		
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	LC		
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811	LC		
<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	LC		
<i>Silene muscipula</i> L., 1753	NA		
<i>Silene noctiflora</i> L., 1753	VU	B(1+2)b(i)c(iv)(-1)	
<i>Silene nutans</i> L., 1753	LC		
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Silene rupestris</i> L., 1753	LC		
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	LC		
<i>Sinapis alba</i> L., 1753	NA		
<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753	LC		
<i>Sisymbrium altissimum</i> L., 1753	NA		
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq., 1775	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Sisymbrium irio</i> L., 1753	NA		
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	LC		
<i>Sisymbrium strictissimum</i> L., 1753	RE		
<i>Sisyrinchium angustifolium</i> Mill., 1768	NA		
<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene, 1899	NA		
<i>Sium latifolium</i> L., 1753	CR	D1	
<i>Skimmia japonica</i> Thunb., 1783	NA		
<i>Solanum carolinense</i> L.	NA		
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	LC		
<i>Solanum melongena</i> L., 1753	NA		
<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	LC		
<i>Solanum physalifolium</i> var. <i>nitidibaccatum</i> (Bitter) Edmonds, 1986	NA		
<i>Solanum sarachoides</i> Sendtn., 1846	NA		
<i>Solanum tuberosum</i> L., 1753	NA		
<i>Solanum villosum</i> Mill., 1768	NA		
<i>Solidago canadensis</i> L., 1753	NA		
<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	NA		
<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	LC		
<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	LC		
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	LC		
<i>Sonchus maritimus</i> subsp. <i>aquaticus</i> (Pourr.) Nyman, 1879	NA		
<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	LC		
<i>Sonchus palustris</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii,v) + C2a(i,ii)	
<i>Sophora japonica</i> L., 1767	NA		
<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A.Braun, 1864	NA		
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	LC		
<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	LC		
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz, 1763	EN	D1	
<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	NT	pr.D2	cultivé!
<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., 1806	NA		
<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806	NA		
<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr., 1858	NT	pr.D2	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	LC		
<i>Sorbus x thuringiaca</i> (Ilse) Fritsch, 1896	NA		
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench, 1794	NA		
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers., 1805	NA		
<i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871	LC		
<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Sparganium minimum</i> Wallr., 1840	CR	D1	
<i>Spergula arvensis</i> L., 1753	LC		
<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	VU	D2	
<i>Spergula pentandra</i> L., 1753	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser, 1821	NA		
<i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826	NA		
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819	LC		
<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G.Don, 1831	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour., 1790	NA		
<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L., 1753	NA		
<i>Spiraea hypericifolia</i> subsp. <i>obovata</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) H.Huber, 1964	NA		
<i>Spiraea japonica</i> L.f., 1782	NA		
<i>Spiraea salicifolia</i> L., 1753	NA		
<i>Spiraea x arguta</i> Zabel, 1884	NA		
<i>Spiraea x billardii</i> Herincq, 1857	NA		
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	RE		
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	EN	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	LC		
<i>Stachys alpina</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763	LC		
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763	EN	B(1+2)b(i,iii)c(iv)	
<i>Stachys byzantina</i> K.Koch, 1848	NA		
<i>Stachys germanica</i> L., 1753	VU	D1	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	LC		
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévisan var. <i>alpestris</i> F. Kirschleger	NA		
<i>Stachys palustris</i> L., 1753	LC		
<i>Stachys recta</i> L., 1767	LC		
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	LC		
<i>Stachys x ambigua</i> Sm., 1810	NA		
<i>Staphylea pinnata</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	LC		
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	LC		
<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	LC		
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	LC		
<i>Stellaria neglecta</i> Weihe, 1825	VU	D2	
<i>Stellaria nemorum</i> L., 1753	LC		
<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré, 1863	VU	D2	
<i>Stellaria palustris</i> Retz., 1795	EN	B(1+2)ab(iii)	mesures!
<i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>lutetiana</i> H.Scholz, 1968	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Stipa pennata</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Stratiotes aloides</i> L., 1753	NA		
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC., 1805	EN	D1	
<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	LC		
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake, 1914	NA		
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995	NA		
<i>Symphyotrichum novae-angliae</i> (L.) G.L.Nesom, 1995	NA		
<i>Symphyotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L.Nesom, 1995	NA		
<i>Symphyotrichum x salignum</i> (Willd.) G.L.Nesom, 1995	NA		
<i>Symphytum asperum</i> Lepech., 1805	NA		
<i>Symphytum bulbosum</i> K.F.Schimp., 1825	VU	D2	
<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	LC		
<i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman, 1855	NA		
<i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	NA		
<i>Tagetes erecta</i> L., 1753	NA		
<i>Tagetes patula</i> L., 1753	NA		
<i>Tamarix gallica</i> L., 1753	NA		
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	NT	pr.D2	
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip., 1844	NA		
<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	LC		
<i>Taraxacum apenninum</i> Dahlst. ex H.Lindb.	DD		
<i>Taraxacum campylodes</i> G.E.Haglund, 1948	LC		
<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser, 1821	DD		
<i>Taraxacum fulvum</i> Raunk., 1906	NA		
<i>Taraxacum glaucescens</i> M. Bieb.	NA		
<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC., 1813	NA		
<i>Taraxacum linguatum</i> M.P.Christ. & Wiinst., 1934	DD		
<i>Taraxacum obliquum</i> (Fries) Dahlst.	NA		
<i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons, 1798	DD		
<i>Taraxacum silesiacum</i> Dahlst. ex G.E.Haglund, 1938	NA		
<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich., 1810	NA		
<i>Taxus baccata</i> L., 1753	LC		
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	LC		
<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg., 1816	NA		
<i>Tellima grandiflora</i> (Pursh) Douglas ex Lindl., 1828	NA		
<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B.Nord., 1978	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
<i>Tephrosieris palustris</i> (L.) Fourr., 1868	NA		
<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth, 1788	LC		
<i>Tetragonolobus purpureus</i> Moench, 1794	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	NT	pr.B2b(iii)c(iv)	
<i>Teucrium capitatum</i> L., 1753	NA		
<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	LC		
<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv,v)	mesures!
<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	LC		
<i>Thalictrum alpinum</i> L., 1753	NA		
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii)	
<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	LC		
<i>Thalictrum minus</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>majus</i> (Crantz) Hook.f., 1870	DD		
<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces., 1844	VU	D2	
<i>Thalictrum simplex</i> L., 1767	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	VU	D2	
<i>Thesium alpinum</i> L., 1753	LC		
<i>Thesium kyrnosum</i> Hendrych, 1964	NA		
<i>Thesium linophyllum</i> L., 1753	EN	B2ab(iii)	
<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr., 1788	EN	B(1+2)ab(i,iii)	
<i>Thlaspi alliaceum</i> L., 1753	NA		
<i>Thlaspi arvense</i> L., 1753	LC		
<i>Thuja occidentalis</i> L., 1753	NA		
<i>Thuja plicata</i> D.Don ex Lamb., 1824	NA		
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Thymus alpestris</i> Tausch ex A.Kern., 1881	DD		
<i>Thymus froelichianus</i> Opiz, 1831	VU	D2 + B(1+2)ab(iii)	
<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás subsp. <i>polytrichus</i>	DD		
<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	VU	D2	répartition!
<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	LC		
<i>Thymus serpyllum</i> L., 1753	LC		
<i>Thymus vulgaris</i> L., 1753	NA		
<i>Thyselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	VU	D2	
<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	LC		
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	LC		
<i>Tilia tomentosa</i> Moench, 1785	NA		
<i>Tilia x europaea</i> L., 1753	NA		
<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	LC		
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	LC		
<i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
Tragopogon pratensis L., 1753	LC		
Tragus racemosus (L.) All., 1785	NA		
Trapa natans L., 1753	VU	D2	cultivé!
Traunsteinera globosa (L.) Rchb., 1842	EN	C2a(i)	
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849	NT	pr.D2	
Trifolium alpestre L., 1763	NT	pr.B2b(iii)	
Trifolium arvense L., 1753	LC		
Trifolium aureum Pollich, 1777	LC		
Trifolium badium Schreb., 1804	NA		
Trifolium campestre Schreb., 1804	LC		
Trifolium campestre var. minus (W.D.J.Koch) Gremler	NA		
Trifolium dubium Sibth., 1794	LC		
Trifolium fragiferum L., 1753	NT	pr.D2	
Trifolium hybridum L., 1753	NA		
Trifolium incarnatum L., 1753	NA		
Trifolium medium L., 1759	LC		
Trifolium montanum L., 1753	LC		
Trifolium ochroleucon Huds., 1762	VU	D2	
Trifolium patens Schreb., 1804	NA		
Trifolium pratense L., 1753	LC		
Trifolium repens L., 1753	LC		
Trifolium resupinatum L., 1753	NA		
Trifolium rubens L., 1753	VU	D2	
Trifolium scabrum L., 1753	EN	B(1+2)ab(ii,iii,iv)	
Trifolium spadiceum L., 1755	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Trifolium striatum L., 1753	NT	pr.D2	
Trifolium subterraneum L., 1753	NA		
Triglochin palustre L., 1753	EN	B(1+2)ab(i,iii)	
Trinia glauca (L.) Dumort., 1827	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	mesures!
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844	LC		
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz., 1962	NA		
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812	LC		
Triticum aestivum L., 1753	NA		
Triticum durum Desf., 1798	NA		
Triticum spelta L., 1753	NA		
Trollius europaeus L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv) + D2	répartition!
Tropaeolum majus L., 1753	NA		
Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
Tulipa gesneriana L., 1753	NA		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Tulipa sylvestris</i> L., 1753	EN	A2a	
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., 1814	RE		
<i>Turritis glabra</i> L., 1753	LC		
<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	LC		
<i>Typha angustifolia</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	LC		
<i>Typha minima</i> Funck, 1794	EN	B2ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Typha shuttleworthii</i> W.D.J.Koch & Sond., 1846	NA		
<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	NA		
<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	NA		
<i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762	LC		
<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	NT	pr.A3e	
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	LC		
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	LC		
<i>Urtica urens</i> L., 1753	LC		
<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	NT	pr.B2b(iii)	
<i>Utricularia bremii</i> Heer ex Köll., 1839	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Utricularia intermedia</i> Hayne, 1800	DD		
<i>Utricularia minor</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Utricularia ochroleuca</i> R.W.Hartm., 1857	DD		
<i>Utricularia stygia</i> G.Thor, 1988	DD		
<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert, 1965	RE		
<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	LC		
<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Vaccinium uliginosum</i> L., 1753	LC		
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L., 1753	LC		
<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	LC		
<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	VU	D2	
<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	LC		
<i>Valeriana pratensis</i> Dierb., 1825	NA		
<i>Valeriana tripteris</i> L., 1753	LC		
<i>Valerianella carinata</i> Loisel., 1810	LC		
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776	VU	B2b(i,iii)c(iv)(-1)	
<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv., 1809	VU	D2	
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	LC		
<i>Valerianella rimosa</i> Bastard, 1814	LC		
<i>Vandenboschia speciosa</i> (Willd.) Kunkel, 1966	LC		
<i>Veratrum album</i> L., 1753	EN	B(1+2)ab(iii)	

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Verbascum blattaria</i> L., 1753	LC		
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol., 1810	LC		
<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	LC		
<i>Verbascum nigrum</i> L., 1753	LC		
<i>Verbascum phlomoides</i> L., 1753	VU	B2ab(i)	
<i>Verbascum phoeniceum</i> L., 1753	NA		
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779	VU	D2	
<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	LC		
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes, 1787	NA		
<i>Verbena bonariensis</i> L., 1753	NA		
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	LC		
<i>Verbena rigida</i> Spreng., 1827	NA		
<i>Verbesina alternifolia</i> (L.) Britton ex Kearney, 1893	NA		
<i>Veronica acinifolia</i> L., 1762	EN	B2ab(i,ii,iv)	
<i>Veronica agrestis</i> L., 1753	VU	B2b(iii)c(iv)(-1)	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	LC		
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>anagalloides</i> (Guss.) Batt., 1890	NA		
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>aquatica</i> Nyman, 1890	DD		
<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	LC		
<i>Veronica austriaca</i> L., 1759	LC		
<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	LC		
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	LC		
<i>Veronica dillenii</i> Crantz, 1769	EN	B2ab(ii,iii,iv)	
<i>Veronica filiformis</i> Sm., 1791	NA		
<i>Veronica fruticans</i> Jacq., 1762	EN	B(1+2)ab(iii) + D1	
<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	LC		
<i>Veronica longifolia</i> L., 1753	CR	B2ab(iii)	
<i>Veronica montana</i> L., 1755	LC		
<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	LC		
<i>Veronica opaca</i> Fr., 1819	EN	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv)	
<i>Veronica peregrina</i> L., 1753	NA		
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	NA		
<i>Veronica polita</i> Fr., 1819	LC		
<i>Veronica praecox</i> All., 1789	VU	D2	
<i>Veronica prostrata</i> L., 1762	EN	C2a(ii)	mesures!
<i>Veronica scutellata</i> L., 1753	LC		
<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	LC		
<i>Veronica spicata</i> L., 1753	EN	B2ab(iii)*	
<i>Veronica triphyllos</i> L., 1753	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Veronica verna</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	LC		
<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	LC		
<i>Viburnum opulus</i> 'Roseum'	NA		
<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl. ex F.B.Forbes & Hemsl., 1888	NA		
<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	NA		
<i>Vicia cracca</i> L., 1753	LC		
<i>Vicia disperma</i> DC., 1813	NA		
<i>Vicia dumetorum</i> L., 1753	VU	D2	
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	LC		
<i>Vicia lathyroides</i> L., 1753	VU	B(1+2)b(iii)c(ii,v)(-1)	
<i>Vicia lutea</i> L., 1753	NA		
<i>Vicia pannonica</i> Crantz, 1769	NA		
<i>Vicia pisiformis</i> L., 1753	VU	B(1+2)ab(i,ii,iv)	
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	NA		
<i>Vicia sepium</i> L., 1753	LC		
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	LC		
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771	LC		
<i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (Lois.) Hook.f., 1870	NA		
<i>Vicia villosa</i> Roth, 1793	LC		
<i>Vinca major</i> L. subsp. <i>major</i>	NA		
<i>Vinca major</i> L., 1753	NA		
<i>Vinca minor</i> L., 1753	NA		
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790	LC		
<i>Viola alba</i> Besser, 1809	NT	pr.B(1+2)b(iii)	
<i>Viola arvensis</i> Murray, 1770	LC		
<i>Viola canina</i> L. subsp. <i>montana</i> (L.) Hartman	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Viola canina</i> L., 1753	LC		
<i>Viola canina</i> subsp. <i>schultzii</i> (Billot) Döll, 1862	CR	B(1+2)ab(ii,iii,iv,v) + D1	
<i>Viola elatior</i> Fr., 1828	EN	B2ab(ii,iii,iv)	
<i>Viola hirta</i> L., 1753	LC		
<i>Viola lutea</i> Huds., 1762	LC		
<i>Viola mirabilis</i> L., 1753	NT	pr.D2	
<i>Viola odorata</i> L., 1753	LC		
<i>Viola palustris</i> L., 1753	LC		
<i>Viola persicifolia</i> Schreb., 1771	EN	B(1+2)ab(i,iii)	
<i>Viola pumila</i> Chaix, 1785	EN	B2ab(ii,iii,iv)	
<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857	LC		
<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	LC		

La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace

Septembre 2014

<i>Nom scientifique</i>	Catégorie Liste rouge Alsace	Critère Liste rouge Alsace	Commentaire
<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt, 1791	CR	B(1+2)ab(i,ii,iii,iv,v) + D1	
<i>Viola saxatilis</i> F.W.Schmidt, 1794	NT	pr.D2	
<i>Viola tricolor</i> L., 1753	LC		
<i>Viola x mantziana</i> W.Becker, 1910	NA		
<i>Viola x wittrockiana</i> Gams ex Kappert, 1932	NA		
<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh., 1800	EN	B2ab(iii)	
<i>Viscum album</i> L., 1753	LC		
<i>Visnaga daucooides</i> Gaertn., 1788	NA		
<i>Vitis vinifera</i> L. subsp. <i>vinifera</i>	NA		
<i>Vitis vinifera</i> L., 1753	NA		
<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi, 1925	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824	NA		
<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824	NA		
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	LC		
<i>Vulpia myuros</i> subsp. <i>sciuroides</i> (Roth) Rouy	VU	D2	
<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace, 1978	NA		
<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	CR*	B2ab(iv,v) + D1	
<i>Weigela florida</i> (Bunge) DC.	NA		
<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet, 1826	NA		
<i>Xanthium orientale</i> L., 1763	NA		
<i>Xanthium spinosum</i> L., 1753	NA		
<i>Xanthium strumarium</i> L., 1753	NA		
<i>Xanthoselinum alsaticum</i> (L.) Schur, 1866	LC		
<i>Zannichellia palustris</i> L., 1753	LC		
<i>Zea mays</i> L., 1753	NA		
<i>Zinnia elegans</i> Jacq., 1792	NA		

Bibliographie

- ANTONETTI P., NICOLAS S. - 2012. Liste rouge de la flore vasculaire de la région Auvergne (cotation selon la méthode UICN). Rapport du Conservatoire Botanique National du Massif-Central.
- AUVERT S. - 2011. Liste rouge de la flore Ile-de-France. Notice méthodologique. Rapport du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, délégation Ile-de-France.
- BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.) - 2012. Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n°3a – mars 2011. Centre régional de phytosociologie agréé, Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie.
- BREUNIG T., DEMUTH S. - 1999. Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen Baden-Württemberg. - 3., neu bearbeitete Fassung. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU).
- BRISSE H., KERQUELEN M. - 1994. Code Informatisé de la Flore de France - CIFF. Bull. de l'A.I.A.B., 1.
- BUTTLER KP., HARMS KH. - 1998. Florenliste von Baden –Württemberg. - Liste der Farn- und Samenpflanzen (Pteridophyta et Spermatophyta). Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU).
- CHAURAND J. - 2011. Trame Verte et Bleue. Critères de cohérence interrégionale, nationale et transfrontalière - Réflexion sur la méthodologie à adopter pour définir des listes d'espèces végétales « déterminantes » Trame Verte et Bleue. Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux. Paris.
- DAVROUX A., HUET R., VANGENDT J., SIMLER N. – 2013. Orientations stratégiques du Conservatoire Botanique d'Alsace pour la conservation et la connaissance de la flore vasculaire - Méthodologie de hiérarchisation des enjeux. Rapport du Conservatoire Botanique d'Alsace.
- DANTON Ph., BAFFRAY M. - 1995. Inventaire des plantes protégées en France. AFCEV - Yves-Rocher. Ed. Nathan, Paris.
- ENGEL R., MATHÉ H.- 2003. Orchidées sauvages d'Alsace et des Vosges. Ed. du Griffon.
- FRIED G. - 2009. Atlas de la flore messicole en Alsace. Société Botanique d'Alsace.
- GAVAZZI E. - 1995. Liste des espèces végétales protégées en France. Etat au 17/10/1995. S.P.N. I.E.G.B./M.N.H.N., Paris.
- HERBIER DE L'UNIVERSITE DE STRASBOURG, SOCIETE BOTANIQUE D'ALSACE. - 2013. Liste des plantes indigènes, naturalisées, introduites et cultivées en Alsace. Document numérique.
- HERVEY A. - 1995. Guide illustré des plantes sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale. Ministère de l'Environnement, Office National de la Chasse.
- HOFF M. - 2003. Corrections et compléments par rapport à la liste rouge de la Flore d'Alsace. Bulletin de liaison de la Société Botanique d'Alsace 16 : 5-6.
- HOFF M., TINGUY, H. (coord.) - 2009. Première liste des espèces végétales déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF d'Alsace. Bulletin de Liaison de la Société Botanique d'Alsace 26 : 56-70.
- HOFF M., TINGUY H. (coord.) - 2010. Liste des espèces déterminantes ZNIEFF. Région Alsace. Société Botanique d'Alsace. <http://www.sbalsace.org/>
- HOFF M. - 2012. Inventaire de la flore du Rhin supérieur ; Floren Liste vom Oberrheingebiet. Société Botanique d'Alsace, Strasbourg.
- HÜGIN G. - 2006. Die Gattung Alchemilla im Schwarzwald und seinen Nachbargebirgen (Vogesen, Nord-Jura, Schwäbische Alb). Berichte des Botanischen Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland. Beheft 2. Karlsruhe
- ISSLER E., LOYSON E., WALTER E. - 1965. Flore d'Alsace. Plaine rhénane, Vosges et Sundgau. Société d'étude de la flore d'Alsace, Institut de Botanique, Strasbourg.

ISSLER E., LOYSON E., WALTER E. - 1982. Flore d'Alsace. Plaine rhénane, Vosges et Sundgau. 2ème édition. Société d'étude de la flore d'Alsace, Institut de Botanique, Strasbourg.

KIRSCHLEGER F. - 1857. Flore d'Alsace et des contrées limitrophes. Strasbourg, Paris.

MAGNANON S. (coord.) - 2009. Méthode utilisée par le CBN de Brest pour l'élaboration de listes rouges (UICN) et de listes de taxons rares et/ou en régression à l'échelle régionale ou départementale. Rapport du Conservatoire Botanique National de Brest.

LAMBINON J., DELVOSALLE L., DUVIGNEAUD J. - 2004. Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes). Cinquième édition. Édition du jardin botanique national de Belgique, Meise.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - 1982. Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national. Journal Officiel du 13 mai 1982.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - 1982. Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national (modifié par l'arrêté du 15 septembre 1982). Journal Officiel du 15 septembre 1982.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - 1993. Arrêté ministériel du 28 juin 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Alsace complétant la liste nationale. Journal Officiel du 10 janvier 1993.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT - 1995. Arrêté ministériel du 31 août 1995 portant modifications de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. Journal officiel du 31 août 1995.

ODONAT (Coord.) - 2003. Les listes rouges de la nature menacée en Alsace. Collection Conservation, Strasbourg.

OLIVIER L., GALLAND J.P., MAURIN H. - 1995. Livre Rouge de la Flore menacée de France. Tome 1 : Espèces prioritaires. Institut d'Ecologie et de Gestion de la Biodiversité, Service du Patrimoine Naturel, Coll. Patrimoines Naturels, Série Patrimoine génétique, 20.

PERRIER C. - 1998. Annuaire des Espèces Végétales Protégées de France (métropole et départements d'Outre-mer). Index des Noms latins. Index des Noms français. Arrêtés de protection. 2ème Edition.

REDURON J.P. - 1986. La liste nationale ou liste des espèces de Haute-Alsace protégées au niveau national. In : « Le Patrimoine Floral de Haute-Alsace ». Bull. Soc. Ind Mulhouse, 800 : 75-76.

REDURON J.P.- 1990. Proposition pour une liste des espèces végétales protégées en Alsace. Multigr.

SEBALD O., SEYBOLD S., PHILIPPI G., WÖRZ A. - 1990-1998. Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. 8 Bde. Ulmer, Stuttgart.

SOCIETE BOTANIQUE D'ALSACE, 2003 -. Les plantes vasculaires. Les plantes à graines et les fougères. In : « ODONAT (Coord.) - 2003. Les listes rouges de la nature menacée en Alsace ». Collection Conservation, Strasbourg, 215-275.

SOCIETE FRANÇAISE D'ORCHIDOPHILIE DE LORRAINE - ALSACE (SFOLA) - 2003-2013. Bulletins de la Société française d'orchidophilie de Lorraine – Alsace. Site internet www.sfola.fr

TAXREF

UICN France - 2011. Guide pratique pour la réalisation de Listes rouges régionales des espèces menacées - Méthodologie de l'UICN & démarche d'élaboration. Paris, France.

UICN - 2003. Lignes directrices pour l'Application, au Niveau Régional, des Critères de l'UICN pour la Liste Rouge. Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN. UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni.

UICN - 2001. Catégories et Critères de l'UICN pour la Liste Rouge: Version 3.1. Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN. UICN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni.

UICN France, MNHN, FCBN et SFO - 2010. La liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Orchidées de France métropolitaine. Paris, France.

UICN France, FCBN & MNHN - 2012. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1000 espèces, sous-espèces et variétés. Dossier électronique.

Sites internet :

<http://www.infoflora.ch/> Centre national de données et d'informations sur la flore de Suisse

<http://www.flora.naturkundemuseum-bw.de/> Zentralstelle für die floristische Kartierung von Baden-Württemberg. Staatliches Museum für Naturkunde, Stuttgart

<http://herbier.unistra.fr/> Herbier de l'Université de Strasbourg

<http://www.atlasflorealsace.com/> Atlas de la Flore d'Alsace

<http://www.sbalsace.org/> Société Botanique d'Alsace :

<http://sophy.u-3mrs.fr/sophy.htm> SOPHY – Base de données phytosociologiques

<http://www.sfola.fr/> Société française d'orchidophilie de Lorraine – Alsace

<http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref>

Annexe 1

Grille de synthèse des critères de l'UICN pour évaluer l'appartenance d'un taxon à l'une des catégories du groupe « menacé » de la Liste rouge (En danger critique, En danger et Vulnérable)

Utiliser n'importe lequel des critères A à E	En danger critique (CR)	En danger (EN)	Vulnérable (VU)
A. Réduction de la population mesurée sur la plus longue des deux durées : 10 ans ou 3 générations			
A1	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%
A2, A3 et A4	≥ 80%	≥ 50%	≥ 30%
<p>A1 Réduction de la taille de la population constatée, estimée, déduite ou supposée, dans le passé, lorsque les causes de la réduction sont clairement réversibles ET comprises ET ont cessé.</p> <p>A2 Réduction de la population constatée, estimée, déduite ou supposée, dans le passé, lorsque les causes de la réduction n'ont peut-être pas cessé OU ne sont peut-être pas comprises OU ne sont peut-être pas réversibles.</p> <p>A3 Réduction de la population prévue ou supposée dans le futur (sur un maximum de 100 ans).</p> <p>A4 Réduction de la population constatée, estimée, déduite ou supposée (sur un maximum de 100 ans), sur une période de temps devant inclure à la fois le passé et l'avenir, lorsque les causes de la réduction n'ont peut-être pas cessé OU ne sont peut-être pas comprises OU ne sont peut-être pas réversibles.</p>			
<p>(a) l'observation directe (<i>sauf A3</i>)</p> <p>(b) un indice d'abondance adapté au taxon</p> <p>(c) la réduction de la zone d'occupation (AOO), de la zone d'occurrence (EOO), et/ou de la qualité de l'habitat</p> <p>(d) les niveaux d'exploitation réels ou potentiels</p> <p>(e) les effets de taxons introduits, de l'hybridation, d'agents pathogènes, de substances polluantes, d'espèces concurrentes ou parasites</p>			
B. Répartition géographique			
B1 Zone d'occurrence (EOO)	< 100 km ²	< 5 000 km ²	< 20 000 km ²
B2 Zone d'occupation (AOO)	< 10 km ²	< 500 km ²	< 2 000 km ²
ET remplir au moins deux des trois conditions a, b ou c suivantes :			
<p>(a) Sévèrement fragmentée OU nb de localités : = 1 ≤ 5 ≤ 10</p> <p>(b) Déclin continu de l'un des éléments suivants : (i) zone d'occurrence, (ii) zone d'occupation, (iii) superficie, étendue et/ou qualité de l'habitat, (iv) nb de localités ou de sous-populations, (v) nb d'individus matures.</p> <p>(c) Fluctuations extrêmes de l'un des éléments suivants : (i) zone d'occurrence, (ii) zone d'occupation, (iii) nb de localités ou de sous-populations, (iv) nb d'individus matures.</p>			
C. Petite population et déclin			
Nombre d'individus matures	< 250	< 2 500	< 10 000
ET remplir au moins un des sous-critères C1 ou C2 suivants :			
C1 Un déclin continu estimé à au moins : (<i>max. de 100 ans dans l'avenir</i>)	25 % en 3 ans ou 1 génération	20 % en 5 ans ou 2 générations	10 % en 10 ans ou 3 générations
C2 Un déclin continu ET l'une des 3 conditions suivantes :			
(a) (i) Nb d'individus matures dans chaque sous-population :	< 50	< 250	< 1 000
(ii) % d'individus dans une sous-population égal à :	90 - 100 %	95 - 100 %	100 %
(b) Fluctuations extrêmes du nb d'individus matures			
D. Population très petite ou restreinte			
D1 Nombre d'individus matures OU	< 50	< 250	< 1 000
D2 Pour la catégorie VU uniquement : Zone d'occupation restreinte ou nb de localités limité et susceptibles d'être affectées à l'avenir par une menace vraisemblable pouvant très vite conduire le taxon vers EX ou CR.			En règle générale : AOO < 20 km ² ou nb de localités ≤ 5
E. Analyse quantitative sur 100 ans maximum			
Indiquant que la probabilité d'extinction dans la nature est :	≥ 50 % sur 10 ans ou 3 générations	≥ 20 % sur 20 ans ou 5 générations	≥ 10 % sur 100 ans

Structures partenaires:



Lorraine - Alsace



Projet réalisé avec le soutien de :



Cette action a été cofinancée par l'Union Européenne.
Fonds européen agricole pour le développement rural :
l'Europe investit dans les zones rurales.