

---

# Présentation BIO

## Espèces rencontrées lors de vos plongées à URPEAN

Constance KRYKWINSKY





**GIRELLE COMMUNE**  
**Coris julis | (Linnaeus, 1758)**

**Fiche DORIS N° 651**

**Atlantique, Méditerranée**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Corps élancé, long et cylindrique**

**Femelle : dos brun, bande  
longitudinale blanche sur le flanc**

**Mâle : dos vert, bande longitudinale  
orange avec une large tache noire sur  
le flanc**

doris.ffesm.fr © Véronique LAMARE



**SAR COMMUN**  
**Diplodus sargus | (Linnaeus, 1758)**

**FICHE DORIS N° 463**

**Méditerranée, mer Noire, Atlantique  
Est**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Opercules généralement bordés de  
noir**  
**Tache du pédoncule caudal en forme  
de selle**  
**8 à 9 stries verticales sombres sur le  
dos pour les individus de moins de 15  
cm**  
**Nageoires pelviennes sombres avec  
le bord antérieur blanc**  
**Caudale bordée de noir à son  
extrémité arrière**



**PETITE RASCASSE ROUGE**  
*Scorpaena notata* | Rafinesque, 1810

[Fiche DORIS N° 400](#)

Méditerranée et Atlantique Est

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

Tête massive, gros yeux  
Lambeaux cutanés sur tout le corps  
Aspect épineux  
Coloration à dominante rouge



**COQUETTE**  
**Labrus mixtus | Linnaeus, 1758**

**Fiche DORIS N° 501**

**Sud Norvège à Madère et  
Méditerranée**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Nageoire dorsale à rayons  
Habitat rocheux, entre 2 et 30 m  
Taille variable, entre 20 et 35 cm  
Fort dimorphisme sexuel (juvéniles  
orangés avec trois taches foncées)  
Couleurs : principalement orange et  
bleu turquoise**



## CONGRE

Conger conger | (Linnaeus, 1758)

### Fiche DORIS N° 610

Mer du Nord à Atlantique,  
Méditerranée

### CLÉ D'IDENTIFICATION

Corps serpentiforme, taille moyenne  
2 m

Couleur grise à noire, ventre blanc

Caché le jour dans les failles ou les  
épaves, ne montre que la tête

Grande bouche aux lèvres épaisses

Nageoires caudale, anale et dorsale  
soudées et bordées de noir

Pas de nageoires pelviennes



**MURÈNE COMMUNE**  
*Muraena helena* | Linnaeus, 1758

[Fiche DORIS N° 740](#)

Méditerranée et Atlantique Est

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Corps serpentiforme comprimé  
latéralement**  
**Grande gueule à puissantes  
mâchoires**  
**Narines tubulaires**  
**Absence de nageoires pectorales,  
nageoire dorsale continue**  
**Peau sans écailles, couleur brun  
violacé avec marbrures blanches et  
jaunes**



doris.ffessm.fr © Vincent MARAN

**SAR TAMBOUR**  
**Diplodus cervinus | (Lowe, 1838)**

**Fiche DORIS N° 471**

**Atlantique Est, Méditerranée**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**5 larges bandes verticales plus ou moins sombres sur le dos**  
**Lèvres épaisses**



## SOLE

*Solea solea* | (Linnaeus, 1758)

### Fiche DORIS N° 135

Mer du Nord, Manche, océan  
Atlantique, Méditerranée

### CLÉ D'IDENTIFICATION

Corps de forme ovale  
Museau arrondi montrant une petite  
bouche arquée  
Tache sombre située à l'arrière et vers  
le haut de la nageoire pectorale  
Frange sombre souvent à l'extrémité  
de la caudale



**TORPILLE MARBRÉE**  
**Torpedo marmorata | Risso, 1810**

**Fiche DORIS N° 321**

**Méditerranée, Atlantique**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Poisson en forme de disque épais et arrondi**

**Deux nageoires dorsales, la première un peu plus développée que la seconde**

**Coloration marbrée à mouchetée de dessins clairs ou sombres sur fond beige à brun foncé**

**Spiracles avec 6 à 8 papilles qui se touchent à leur extrémité**



doris.ffesm.fr © Thomas VIGNAUD

**CHAPON**

**Scorpaena scrofa | Linnaeus, 1758**

**[Fiche DORIS N° 656](#)**

**Méditerranée et Atlantique Est**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Tête massive, grande bouche**

**Lambeaux cutanés sur tout le corps  
et particulièrement sous la mâchoire**

**Aspect épineux**

**Coloration à dominante rouge**



**ROUGET-BARBET DE ROCHE**  
**Mullus surmuletus | Linnaeus, 1758**

**[Fiche DORIS N° 500](#)**

**Mer du Nord à l'Atlantique Nord-Est,  
Méditerranée, mer Noire**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Corps allongé  
Grosses écailles  
2 barbillons mentonniers  
Ligne latérale foncée  
1ère dorsale striée**



## **SAUPE**

**Sarpa salpa | (Linnaeus, 1758)**

**Fiche DORIS N° 431**

**Atlantique, Méditerranée**

### **CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Corps allongé, comprimé  
latéralement**

**Bouche petite**

**Dos gris jaune à verdâtre avec des  
reflets or**

**10 à 12 lignes longitudinales jaune vif**

**Petite tache noire à la base des  
pectorales**

**Œil doré**



**TACAUD COMMUN**  
**Trisopterus luscus | (Linnaeus, 1758)**

**Fiche DORIS N° 1343**

**Mer du Nord, Manche, Atlantique  
Nord-Est, Méditerranée occidentale**

### **CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Corps ovale et élevé**  
**Œil gros**  
**Mâchoire inférieure en retrait**  
**Barbillon mentonnier**  
**Tache noire à la base des nageoires  
pectorales**  
**Couleur beige clair, généralement  
quatre / cinq bandes verticales  
foncées**



**BALISTE COMMUN**  
**Balistes capriscus | Gmelin, 1789**

**Fiche DORIS N° 891**

**Atlantique, Méditerranée**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Forme ovale du corps**

**Couleur grisâtre uniforme**

**Grosse tête, petit œil**

**Première nageoire dorsale à 3 épines**

**Deuxième nageoire dorsale élevée**

**Nageoire caudale effilée en croissant**



**POISSON-LUNE**  
**Mola mola | (Linnaeus, 1758)**

**Fiche DORIS N° 344**

**Cosmopolite des mers tropicales à tempérées**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Corps discoïde de taille importante (50 à 300 cm)**

**Nageoires dorsale et anale, de bonne taille, triangulaires, reculées et opposées**

**Absence de queue, remplacée par une simple frange**

**Occurrence surface**

**Pélagique du grand large (rarement près des côtes)**



**BAR COMMUN, LOUP**  
**Dicentrarchus labrax | (Linnaeus, 1758)**

**[Fiche DORIS N° 407](#)**

**Mer du Nord, Manche, océan Atlantique, Méditerranée**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Corps allongé et légèrement comprimé**

**Deux nageoires dorsales bien séparées, avec presque mêmes longueurs et hauteurs**

**Partie supérieure de la tête assez rectiligne**

**Préopercule avec des crénelures sur l'arrière et des épines vers le bas**

**Opercule avec une tache noire plus ou moins visible**



**GRONDIN-PERLON**  
**Chelidonichthys lucerna | (Linnaeus, 1758)**

**Fiche DORIS N° 875**

**Atlantique Est tempéré et  
Méditerranée**

### **CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Longs rayons de la pectorale  
atteignant le début de la nageoire  
anale**

**Face inférieure de la pectorale ornée  
d'un liseré bleu vif**

**Museau s'étendant loin en avant et se  
terminant par une courbure ou par  
une légère échancrure**

**Petites écailles lui donnant un  
tégument d'allure très lisse**

**Ligne latérale de couleur proche de  
celle du corps ne montrant qu'un  
léger relief**



**GRANDE VIEILLE**  
Labrus bergylta | Ascanius, 1767

[Fiche DORIS N° 872](#)

De la Norvège au Maroc, Açores,  
Madère, Canaries

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

Corps massif  
Une seule nageoire dorsale haute sur  
l'arrière  
Lèvres charnues  
Grosses dents coniques



doris.ffesm.fr © Véronique LAMARE

**SERRAN-CHÈVRE**  
**Serranus cabrilla | (Linnaeus, 1758)**

**Fiche DORIS N° 146**

**Méditerranée, Manche, Atlantique  
oriental, mer Noire**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Serranidé de 10 à 25 cm  
2 à 3 bandes obliques jaune à  
brun-orangé sur la joue  
Ligne longitudinale claire au-dessous  
du milieu du corps**



**CRÉNILABRE COMMUN**  
**Symphodus melops | (Linnaeus, 1758)**

**Fiche DORIS N° 167**

**Mer du Nord, Manche, océan  
Atlantique, Méditerranée**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Flancs parcourus en position dorsale  
de trois bandes longitudinales  
sombres**

**Tache sombre en haricot derrière l'œil**

**Tache sombre au milieu du  
pédoncule caudal**

**Mâle vivement coloré, à dominante  
orange rouge bariolé de vert ou de  
bleu**

**Femelle plus terne et unie, de couleur  
brun argenté**

**20 à 25 centimètres**



doris.ffessm.fr © Claude WACQUANT

## **OBLADE**

**Oblada melanura | (Linnaeus, 1758)**

**Fiche DORIS N° 720**

**Méditerranée, Atlantique Est**

### **CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Tache noire bordée de blanc, en  
forme de selle sur le pédoncule  
caudal**

**Coloration générale gris argenté  
Lignes longitudinales sombres plus  
ou moins marquées sur les flancs  
Bouche oblique orientée vers le haut**



doris.ffessm.fr © Nicolas PERRIN

## CABOT

*Parablennius gattorugine* | (Linnaeus, 1758)

[Fiche DORIS N° 653](#)

Manche, Atlantique et Méditerranée,  
mer Noire

### CLÉ D'IDENTIFICATION

Deux tentacules supra oculaires en  
forme de bouquet  
6 à 8 barres plus sombres qui se  
prolongent sur la nageoire dorsale  
Œil rouge  
Coloration brunâtre



**PASTENAGUE COMMUNE**  
***Dasyatis pastinaca* | (Linnaeus, 1758)**

**Fiche DORIS N° 745**

**Méditerranée, Atlantique Est**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Forme de losange, avec museau pointu**  
**Queue en fouet avec épine dentelée**  
**Dos lisse (absence de tubercules)**  
**Face dorsale grise, face ventrale claire**



**GRANDE VIVE**  
**Trachinus draco | Linnaeus, 1758**

**Fiche DORIS N° 637**

**Méditerranée, mer Noire, Atlantique  
Nord-Est et mer du Nord**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Grande bouche ouverte vers le haut  
Yeux rapprochés situés vers le haut  
(espace interorbitaire =  $\frac{1}{2}$  diamètre  
oculaire)  
Flancs avec stries obliques bleues et  
jaunes (adultes)**



doris.ffesm.fr © Frédéric ANDRE

**LIEU JAUNE**  
**Pollachius pollachius | (Linnaeus, 1758)**

**[Fiche DORIS N° 1441](#)**

**Atlantique, Manche, mer du Nord**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Corps allongé**  
**Œil gros**  
**Ecailles très petites**  
**Couleur claire, blanc jaunâtre brillant**  
**Trois nageoires dorsales, deux anales**  
**Ligne latérale incurvée**



**SSAINT-PIERRE**  
Zeus faber | Linnaeus, 1758

[Fiche DORIS N° 322](#)

Méditerranée, Atlantique, mer Noire

#### CLÉ D'IDENTIFICATION

**Corps haut, fortement comprimé  
latéralement**

**Couleur du gris-vert avec reflets  
argentés à jaune doré**

**Marbrures longitudinales**

**Ocelle noir cerclé de gris au milieu de  
chaque flanc**

**Tête et base des nageoires portent  
épines et crêtes osseuses**

**Yeux hauts, bouche protractile  
largement fendue**



**PETITE ROUSSETTE**  
*Scyliorhinus canicula* | (Linnaeus,  
1758)

[Fiche DORIS N° 531](#)

Mer du Nord, Manche, océan  
Atlantique, Méditerranée

#### CLÉ D'IDENTIFICATION

Petit requin tacheté d'environ 80 cm  
de longueur, à museau arrondi  
Nombreuses petites taches  
brun-noirâtre sur fond beige clair à  
roux  
Ventre clair  
Valvules nasales contigües



**SAR À TÊTE NOIRE**  
**Diplodus vulgaris | (Geoffroy Saint Hilaire, 1817)**

**[Fiche DORIS N° 161](#)**

**Méditerranée, mer Noire, Atlantique oriental**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Corps ovale et comprimé  
latéralement de coloration argentée  
Possède 2 barres noires : l'une sur la  
nuque, l'autre à la base de la nageoire  
caudale  
Rayures jaunes horizontales sur le  
corps**



doris.ffesm.fr © Véronique LAMARE

## **BOGUE**

**Boops boops | (Linnaeus, 1758)**

**[Fiche DORIS N° 2701](#)**

**Méditerranée, Atlantique Nord-Est**

### **CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Corps fusiforme et de section ovale**

**Une nageoire dorsale couvrant les  
3/4 du corps**

**Grands yeux et petite bouche  
terminale protractile**

**Ligne latérale nettement démarquée  
par une couleur sombre**

**Tache noire à la naissance des  
pectorales**



**RAIE BRUNETTE**  
*Raja undulata* | Lacépède, 1802

[Fiche DORIS N° 1303](#)

Atlantique oriental, Manche, mer du Nord, Méditerranée

#### CLÉ D'IDENTIFICATION

Raie de forme plutôt rhomboïdale pouvant atteindre 1 m de long  
Robe brune à verdâtre, lignes sombres sinueuses entourées de points blancs  
Peau rugueuse à cause de denticules cutanés  
Petit rostre à l'avant et yeux légèrement globuleux devant les spiracles  
Une rangée d'épines sur la médiane dorsale allant jusqu'aux nageoires dorsales en se ramifiant  
Ventre blanc



**OMBRINE BRONZE**  
**Umbrina canariensis | Valenciennes,**  
**1843**

[Fiche DORIS N° 3622](#)

**Atlantique Est, Méditerranée**  
**occidentale, océan Indien**

#### **CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Barbillon mentonnier**  
**Bouche petite et infère**  
**Seconde dorsale et caudale bordées**  
**de noir**  
**Diamètre de l'œil supérieur à la**  
**distance interorbitaire**



## CENTROLABRE

*Centrolabrus exoletus* | (Linnaeus, 1758)

[Fiche DORIS N° 2126](#)

Atlantique Est tempéré

### CLÉ D'IDENTIFICATION

Couleurs variant de l'orange sur le haut des flancs au beige sur la face ventrale

Réseau de teinte bleue

Bouche petite

Queue marquée de deux barres verticales sombres



## ROUQUIÉ

*Ctenolabrus rupestris* | (Linnaeus, 1758)

[Fiche DORIS N° 1592](#)

Mer du Nord, Manche, océan  
Atlantique Nord, Méditerranée

### CLÉ D'IDENTIFICATION

Labre brun-orangé, ventre blanc  
Tache circulaire noire haute de  
chaque côté du pédoncule caudal  
Travées écailleuses jaunes orangées  
sur les flancs  
Taille habituelle de 10 à 15 cm



## TRIPTÉRYGION JAUNE

Tripterygion delaisi | Cadenat & Blache, 1970

[Fiche DORIS N° 823](#)

Méditerranée, Atlantique Est des îles Britanniques au nord du Sénégal

### CLÉ D'IDENTIFICATION

Nageoire dorsale en 3 parties

Corps jaune et tête noire chez le mâle en reproduction

Tons bruns chez la femelle et le mâle hors reproduction

Larges barres brunes le long du corps

Tache noire sur le pédoncule caudal des femelles et jeunes mâles



**DRAGONNET**  
**Callionymus lyra | Linnaeus, 1758**

**Fiche DORIS N° 120**

**Mer du Nord, Manche, océan  
Atlantique, Méditerranée**

**CLÉ D'IDENTIFICATION**

**Tête triangulaire**  
**Museau long**  
**Bandes bleues sur le corps et les**  
**nageoires du mâle**  
**Yeux orientés obliquement**  
**Petits orifices branchiaux**  
**2 nageoires dorsales**  
**Nageoires pelviennes en avant des**  
**nageoires pectorales**